



# OVIPRON® TOP

**Composizione** Olio minerale paraffinico 96,5% (800 g/L)

**Formulazione** Liquido emulsionabile

**Tempo di sicurezza** 20 giorni

**Indice di rischio** Non classificato

**N° di registrazione** 11416 del 23.07.2002

**Class. ambientale** N

**Confezione** L 1 - 5 - 20 - 1.000

© Marchio registrato CEREXAGRI

Colture	Avversità	Dosi L/hL
<b>AGRUMI</b> (arancio, limone, mandarino, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro)	Acari, Ragno Rosso, Minatori fogliari, Afide Verde, Cimice, Cocciniglie, Aleurodidi, Tripidi	in primavera-estate 1,5-2 in inverno 2,5-3,5
<b>DRUPACEE</b> (albicocco, ciliegio, pesco, susino, mandorlo)	Cicaline, Acari, Eriofidi, Metcalfa, Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Uova di Lepidotteri	in primavera-estate 1,5-2 in inverno 2,5-3,5
<b>POMACEE</b> (melo, pero, cotogno)	Cocciniglie, Cicaline, Eriofidi, Acari, Metcalfa, Afidi, Psilla, Tignole, Uova di Lepidotteri	in primavera-estate 1,5-2 in inverno 2,5-3,5
<b>CACO, FICO, RIBES, NOCE, NOCCIOLIO</b>	Cocciniglie, Cicaline, Cimici, Eriofidi, Psilla, Metcalfa, Afidi, Uova di Lepidotteri, Acari	in primavera-estate 1,5-2 in inverno 2,5-3,5
<b>VITE</b> (uva da vino e da tavola)	Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Uova di Lepidotteri, Cicaline, Tignole, Metcalfa, Acari	in primavera-estate 1,5-2 in inverno 2,5-3,5
<b>OLIVO</b> (olive da olio e da tavola)	Cocciniglie, Tignole	in primavera-estate 1,5-2 in inverno 2,5-3,5
<b>FAGIOLO</b>	Afidi, Acari, Tripidi, Ditteri, Aleurodidi, Uova di Lepidotteri e Coleotteri	in periodo vegetativo 1-2,5
<b>CUCURBITACEE</b> (cocomero, melone, zucca, zucchini, cetriolo)	Afidi, Tripidi, Mosca Bianca, Minatori fogliari, Aleurodidi, Uova di Lepidotteri e Coleotteri, Acari, Ditteri	in periodo vegetativo 1-2,5
<b>SEDANO e FINOCCHIO</b>	Afidi, Tripidi, Ditteri, Lepidotteri, Mosca Bianca, Uova di Minatori fogliari, Acari	in periodo vegetativo 1-2,5
<b>CARCIOFO</b>	Afidi, Mosca Bianca, Uova di Lepidotteri, Tripidi, Ditteri Minatori, Acari	in periodo vegetativo 1-2,5
<b>PEPERONE, POMODORO, PATATA</b>	Afidi, Uova di Dorifora, Acari, Ditteri, Tripidi, Aleurodidi, Uova di Lepidotteri e Coleotteri	in periodo vegetativo 1-2,5
<b>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b>	Afidi, Adulti di Altica e Cassida, Mosca delle Bietole	in periodo vegetativo 1-2,5
<b>FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI</b>	Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Lepidotteri, Ditteri, Psille, Cicaline, Tingidi, Metcalfa, Tignole, Aleurodidi, Acari	in fase vegetativa 1,5-2,5 in inverno 2-2,5
<b>ACTINIDIA</b>	Cocciniglia bianca	in periodo vegetativo 1,0
<b>AZIONE COADIUVANTE ERBICIDI</b>		
<b>PEPERONE, POMODORO, PATATA, FAGIOLO, CARCIOFO, SEDANO, FINOCCHIO, CUCURBITACEE</b>		0,75 - 1 L/Ha
<b>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b>		0,5-1 L/Ha
<b>MAIS</b>		0,75-1,5 L/Ha
<b>SOIA (da foglia unifogliata a 3 foglie trilobate)</b>		1-2 L/Ha

OVIPRON® TOP è un olio estivo che impiega una base paraffinica a bassa viscosità. Il formulato presenta quindi un'elevata selettività sulla pianta ed una fluidità che facilita l'operatore nelle fasi di dosaggio e di distribuzione.

