

GERAMID-NEU

FITOREGOLATORE LIQUIDO ATTO A FAVORIRE IL DIRADAMENTO DEI FRUTTI NEL MELO, PERO, SUSINO, ALBICOCCO ED EVITARE LA CASCOLA DEL CILIEGIO.

COMPOSIZIONE

NAD puro g 4,0 = (44,8 g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante..... q.b. a g 100,0

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il Geramid-Neu ha lo scopo di liberare gli alberi dalla fruttificazione superflua, permettendo di sviluppare bene i frutti rimasti migliorandone la qualità e rompendo l'alternanza periodica caratteristica di alcune varietà di piante fruttifere.

Melo	Golden Delicious , Summerred, Morgenduft, Ozark Gold	150-200	ml/hl
	Jonagold, Gravensteiner, Winesap, Stayman Red, Elstar	120-170	ml/hl
	Jonathan, Granny Smith	100-130	ml/hl
	Gruppo Gala	75-120	ml/hl
	Idared	75-100	ml/hl

Sulle altre varietà effettuare saggi preliminari prima dell'impiego intensivo. La dose di impiego si riferisce ad un consumo medio di 15 quintali di acqua per ettaro.

E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata dopo la sfioritura (caduta petali). Il periodo ottimale si ha quando i frutticini centrali hanno raggiunto un diametro di 6-8 mm per quelli più sviluppati. In Trentino-Alto Adige si consiglia di anticipare il trattamento appena tali frutticini hanno raggiunto 4-5 mm di diametro. Le piante dovranno essere irrorate solo sulla metà superiore per evitare un ipertrattamento delle fronde più basse.

Ciliegio 150-200 ml/hl

Per evitare la cascola di maggio effettuare un trattamento quando circa il 75% dei petali sono caduti.

Pero, Susino, Albicocco 100-200 ml/hl

Effettuare il trattamento alla caduta dei petali fino a due settimane dopo.

Le condizioni di temperatura e umidità durante e immediatamente dopo il trattamento influenzano la efficacia del Geramid-Neu, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento con Geramid-Neu sono: temperatura compresa tra 10 e 25°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori a 20°C diminuire il dosaggio del 10%.

Avvertenza: Non intervenire su piante giovani già soggette naturalmente a cascola, su piante con debole vegetazione o colpite da parassiti, con numerosi frutticini senza o con un solo seme (che cadranno naturalmente) quando si è oltrepassato il periodo ottimale per l'intervento. Non applicare con mezzi aerei. Non si consiglia la miscela con antiparassitari. Nocivo per gli organismi acquatici. Intervallo di sicurezza: 30 gg. Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.



I- 16013 Campo Ligure (GE) Via Vallecaldà, 33
Tel.: +39 010 920 395 Fax : +39 010 921 400
e-mail: info@lgobbi.it http://www.lgobbi.it
SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

l. gobbi s.r.l.

Conc. E. Gerlach GmbH - Germania

