

## FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DELLA TICCHOLIATURA DELLE POMACEE E MONILIA DELLE DRUPACEE

CHORUS è un fungicida endoterapico efficace contro Ticchiolatura e Monilia, con attività collaterale antioidica.

Assorbito rapidamente dalla vegetazione, è poco influenzato dall'azione dilavante delle piogge.

È attivo anche a basse temperature (da 5°C).

### FUNGICIDA



Frutta

#### COMPOSIZIONE

Cyprodinil 50%

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

N - pericoloso per l'ambiente

#### FORMULAZIONE

granuli idrodispersibili

#### NUMERO DI REGISTRAZIONE

9373 del 29.9.97

### DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (g/hl)	Dosi (g/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Melo Pero	Ticchiolatura	30	450 (dose massima 750)	Da punte verdi a fine fioritura, impiegare in miscela con un partner di copertura a dose ridotta. Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni, oppure in presenza dei sistemi di allerta eseguire trattamenti curativi entro 48-72 ore dalla pioggia infettante	21 gg
Albicocco Nettarine Pesco Susino	Monilia dei fiori e dei rametti	30	450	Effettuare i trattamenti tra inizio fioritura e caduta petali. Questi trattamenti sono consigliabili quando l'andamento stagionale è caratterizzato da elevata umidità ambientale	7 gg
	Monilia dei frutti	50	750	Effettuare 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7-10 giorni	

### ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Indipendentemente dal volume di bagnatura rispettare sempre la dose per ettaro. Non applicare su vegetazione bagnata.

### CONFEZIONI

scatole da **1 kg**  
in cartoni da 10 pezzi

