

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DELLA TICCHIOLATURA DEL MELO, PERONOSPORA DELLA PATATA E BOTRITE DELLA VITE

OHAYO è un fungicida di copertura, efficace nel controllo della Ticchiolatura del melo, della Peronospora della patata e della Botrite della vite. Su melo possiede un'eccellente attività collaterale sull'Alternariosi.

FUNGICIDA



Frutta

Orticole

Vite

COMPOSIZIONE

Fluazinam 39,5%
(500 g/l)

INDICAZIONI DI PERICOLO

Xi - irritante
N - pericoloso per l'ambiente

FORMULAZIONE

sospensione concentrata

NUMERO DI REGISTRAZIONE

9286 del 17.7.97

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Melo	Ticchiolatura	40 - 70 ml/hl	<p>Ticchiolatura: in miscela a CHORUS o SCORE alla dose di 40 ml/hl; da solo negli interventi di copertura alla dose di 60 ml/hl</p> <p>Ticchiolatura e Alternariosi (effetto collaterale): alla dose di 70 ml/hl negli ultimi due trattamenti contro la ticchiolatura primaria (maggio/giugno)</p>	60 gg
Patata	Peronospora	0,3 - 0,4 l/ha in funzione della pressione della malattia	A partire da circa 3 settimane dopo la semina e, comunque, prima della comparsa della malattia, utilizzando un volume d'acqua che assicuri una buona bagnatura	7 gg
Vite da vino	Botrite	100 - 150 ml/hl (1,5 l/ha)	Intervenire nelle condizioni di maggiore suscettibilità alla malattia. Può risultare fitotossico su alcune varietà di vite (Moscato dei colli, Riesling renano, Trebbiano), si raccomanda pertanto di eseguire saggi preliminari su piccole superfici	28 gg

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Il prodotto può essere impiegato sulla patata senza limitazioni al numero di trattamenti. Va applicato ad intervalli regolari di 7-10 giorni, adottando la cadenza più breve in presenza di condizioni favorevoli alla malattia. In presenza di peronospora o di forte sviluppo della vegetazione intervenire con RIDOMIL GOLD R WG.

CONFEZIONI



flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi