



# SUPRAFOS® WG

**INSETTICIDA FOSFORGANICO AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE  
FORMULATO IN GRANULI IDRODISPERDIBILI**

## CARATTERISTICHE E CAMPI DI APPLICAZIONE:

SUPRAFOS WG è un insetticida ad ampio spettro di azione efficace sui principali parassiti di pomacee, drupacee, olivo, agrumi e patata.

Per il suo profilo tossicologico e il limitato impatto sulla fauna utile, SUPRAFOS WG è la scelta ideale per i programmi di difesa integrata.

SUPRAFOS WG si acquista senza patentino.

<b>COMPOSIZIONE</b> Fosmet 23,5% Sostanza attiva GOWAN Cl&S	<b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b> N - pericoloso per l'ambiente	<b>FORMULAZIONE</b> microgranuli idrodisperdibili	<b>NUMERO DI REGISTRAZIONE</b> 14043 del 2.11.07
---	---	--	---

## DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	Dosi (g / hl)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Melo	Carpocapsa, Cidia, Tortricidi ricamatori	220 - 250	Intervenire al picco del volo	21 gg
	Microlepidotteri minatori, Orgia, Psilla, Antonomo, Falene, Sesia, Rizotrogo			
	Neanidi di Cocciniglie	250 - 300	Intervenire nella fase di migrazione	
Pera	Carpocapsa, Cidia, Tortricidi ricamatori	220 - 250	Intervenire al picco del volo	21 gg
	Psilla, Tentredini			
	Neanidi di Cocciniglie	250 - 300	Intervenire nella fase di migrazione	
Pesco	Cidia, Anarsia	220 - 250	Intervenire al picco del volo	14 gg susino
Albicocco	Microlepidotteri minatori, Mosca della frutta, Mosca del ciliegio, Eulia, Orgia, Nottue	250 - 300	<b>Mosca del ciliegio:</b> prima dell'invasatura in presenza di catture nelle trappole	28 gg pesco e albicocco
Ciliegio	Tripidi		Intervenire nelle fasi di migrazione	30 gg ciliegio
Susino	Neanidi di Cocciniglie			
Agrumi	Afidi	220 - 250	In pre-fioritura e a caduta petali in assenza di accartocciamenti fogliari	30 gg
	Tignola della zagara, Minatrice serpentina, Mosca della frutta, Cimicetta verde, Metcalfa		<b>Mosca della frutta:</b> all'invasatura in presenza di catture nelle trappole	
	Neanidi di Cocciniglie	250 - 300	Intervenire nelle fasi di migrazione	
Olivo	Mosca, Tignola, Margaronia, Oziorrinco	220 - 250	<b>Mosca:</b> alle primissime penetrazioni. <b>Tignola:</b> intervenire contro la generazione carpo-faga (giugno-luglio) al picco del volo. Se necessario ripetere il trattamento.	30 gg
	Neanidi di Cocciniglie	250 - 300	Intervenire nelle fasi di migrazione.	
Patata	Nottue, Cavolaia, Dorifora, Tignola	2,5 - 3 kg/ha		30 gg

## ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

L'efficacia e la persistenza ottimale di SUPRAFOS WG si ottengono quando il pH della soluzione è acido (circa 5,5). In caso di acque o soluzioni con pH molto alcalino si consiglia l'aggiunta di un acidificante.

## CONFEZIONI

scatole da **1 kg**  
in cartoni da 10 pezzi

sacchi da **5 kg**  
in cartoni da 4 pezzi

