

Enovit® Metil FL

Fungicida sistemico



Composizione	TIOFANATO METILE (*) 38,3% (450 g/l) (*) sostanza attiva originale Nippon Soda Co. Ltd.
Formulazione	Flowable
Classe Tox.	Xn, N
N. registrazione	7611 del 23-11-1988
Confezione	x 0,25 l, x 1 l, x 5 l

CARATTERISTICHE

Fungicida sistemico ad attività preventiva e curativa ed ampio spettro d'azione. Grazie alla formulazione flowable, ENOVIT METIL FL contiene un elevato numero di particelle molto fini che ne migliorano la distribuzione sulla vegetazione trattata rispetto ai formulati in polvere bagnabile.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Altre colture	15 gg.
Frumento	30 gg.

AVVERTENZE

Non miscibile con prodotti a reazione alcalina.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pesce, Albicocco, Susino	Monilia, Oidio, Sclerotinia Fusicoccum, Citospora	85-100 ml/hl 100 ml/hl
Melo, Pero	Ticchiolatura, Oidio	100-140 ml/hl trattamenti pre-florali. 70-85 ml/hl nei trattamenti successivi. Per trattamenti curativi intervenire entro 60-72 ore dall'inizio delle piogge infettanti, usando le dosi massime.
Vite	Botrytis, Oidio	100 ml/hl
Frumento	Malattie del piede (Fusariosi, Rizoctonia, Cercosporiella, Oftobolo)	1-1,2 l/ha in 400-500 l d'acqua per intervento durante l'accestimento alla levata.
Fiori	Botrytis, Oidio	85-100 ml/hl
Rosa, Pianta Ornamentali	Oidio	85-100 ml/hl
Bulbose (Gladioli, Tulipani ecc.)	Marciumi da Fusarium, Penicillium, Botrytis, Sclerotinia Botrytis, Fusariosi (in campo)	1000-1400 ml/hl per immersione (15-30 min) prima dell'impianto 100-140 ml/hl.
Garofano	Fusariosi, Verticillosi	2-3 ml/mq in 5-10 litri d'acqua.