



THIOCUR[®] FORTE

Fungicida sistemico
antioidico per colture
arboree ed ortive

Composizione:
Miclobutanil puro: 4,5 %
(= 45,5 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

**Indicazione di
pericolo:**
NC Non classificato

Formulazione:
Emulsione acquosa

Confezione:
Bottiglia PET da 1 litro
Bottiglia PET da 5 litri

Imballo:
10 confezioni da 1 litro
4 confezioni da 5 litri

Registrazione:
N° 13111 del 17/01/2006

COLTURE	PRINCIPALI PARASSITI CONTROLLATI	DOSI	NOTE E/O EPOCA DI IMPIEGO	TEMPI DI CARENZA
Vite da Vino Vite da tavola	<i>Oidio</i> <i>Marciume nero (Guignardia bidwellii)</i>	100 - 125 ml/hl 125 - 150 ml/hl	Iniziare i trattamenti quando i germogli sono ben formati. Proseguire ad intervalli di 10-12 giorni fino all'allegagione. Dopo l'allegagione impiegare la dose di 125 ml/hl; in caso di forte pressione della malattia aumentare la dose a 150 ml/hl con turni di intervento di 8-10 giorni, per controllare il più efficacemente possibile l'oidio del grappolo e del rachide, soprattutto sulle varietà di uva da tavola più sensibili.	15 giorni
Melo Pera	<i>Ticchiolatura</i> <i>Oidio</i>	125 - 150 ml/hl	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguirli ogni 8-12 giorni a seconda della fase vegetativa e dell'intensità della malattia. Utilizzare in miscela con Mancozeb od altro fungicida di contatto ad azione anti-ticchiolatura.	15 giorni





f u n g i c i d i

COLTURE	PRINCIPALI PARASSITI CONTROLLATI	DOSI	NOTE E/O EPOCA DI IMPIEGO	TEMPI DI CARENZA
Pesco Nettarine Susino Albicocco	<i>Oidio</i> <i>Monilia del fiore e del frutto</i>	125 - 150 ml/hl	Dalla sfioritura, per il controllo dell'oidio, ripetendo i trattamenti per 2-3 volte ad intervalli di 8-12 giorni. Per il controllo della monilia del fiore effettuare due trattamenti a bottoni rosa e a caduta petali. Per la monilia del frutto, effettuare due applicazioni ad intervalli di 6-7 giorni.	7 giorni
Melone, Anguria Zucchini, Cetriolo Zucca	<i>Oidio</i>	125 - 150 ml/hl	Iniziare i trattamenti in maniera preventiva ad intervalli di 8-12 giorni.	3 giorni
Pomodoro Peperone Carciofo	<i>Oidio</i>	125 - 150 ml/hl	Iniziare i trattamenti in maniera preventiva ad intervalli di 8-12 giorni.	3 giorni
Fragola	<i>Oidio</i>	100 - 125 ml/hl	Iniziare i trattamenti in maniera preventiva ad intervalli di 8-12 giorni.	3 giorni
Rosa e Garofano	<i>Oidio</i> <i>Ticchiolatura</i>	100 - 125 ml/hl	Impiegare ad intervalli di 8-12 giorni.	Non richiesto

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenze: su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione, e comunque non più di 2 consecutivi. Le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro

che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale. Per la vite da tavola assicurare una perfetta bagnatura del grappolo. In caso di miscele estemporanee con formulati a base di Fosetyl Al si consiglia: premiscelare la dose di THIOCUR FORTE in acqua (1:10 circa), versare questa pre-mix nella botte, mantenere l'agitatore in movimento, aggiungere i formulati a base di Fosetyl Al.