

PLATINA

Ammendanti e specialità / specialità

Caratteristiche



Riduce l'incidenza della spaccatura dei frutti su ciliegie e altri frutti a bacca. Sulle pere: migliora la qualità dei frutti. In ogni caso migliora l'assorbimento e l'utilizzo del ferro.

Formulazione

Liquida

Composizione

L-Triptofano totale 4,8%

Confezioni

Flaconi 12 x 1000 ml

Campi d'impiego

Fragole, pere, ciliegie

Dosi e modalità d'impiego

Impiego	Dosaggio	Trattamento
Ciliegio	Per via fogliare 1-1,5 l/ha	Per migliorare la qualità ed aumentare il numero di frutti commercializzabili per la ridotta sensibilità alla spaccatura. Max 4 applicazioni. Ripetere a intervalli di 7-10 giorni in previsione di piogge.
Piccoli frutti a	Per via fogliare 1-1,5 l/ha	Per migliorare la qualità ed aumentare il numero di frutti commercializzabili per la ridotta sensibilità alla spaccatura.

bacca rossa		Max 4 applicazioni. Ripetere a intervalli di 7-10 giorni in previsione di piogge.
Pere	Per via fogliare	1,5 l/ha Per migliorare la qualità e il calibro dei frutti: trattare 2 settimane dopo la piena fioritura se le temperature sono relativamente alte o 3 settimane dopo la piena fioritura con clima sfavorevole ma comunque con temperature superiori a 15 °C.