



MACCANI®

FUNGICIDA BIVALENTE AUTORIZZATO
SU MELO E PERO

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono 4 g di **F500®** (**Pyraclostrobin**) e 12 g di **Ditianon**

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili (WG)

CLASSIFICAZIONE

Xn, nocivo
N, pericoloso per l'ambiente

REG. MIN. SALUTE

N° 15114
del 19-12-2012

CONFEZIONE

Flacone da 1 kg
Tanica da 5 kg

IMBALLO

Cartone
- da 10 flaconi
- da 2 taniche

CARATTERISTICHE

MACCANI® è un fungicida di contatto efficace contro le principali malattie fungine delle **Pomacee**. Grazie al suo doppio meccanismo d'azione, il prodotto si caratterizza per un'intrinseca strategia antiresistenza e per il controllo contemporaneo di più malattie fungine, come **Oidio** e **Ticchiolatura del Melo** e di **Maculatura** e **Ticchiolatura del Pero**. Dotato di spiccata attività translaminare ed elevata resistenza al dilavamento, **MACCANI®** agisce anche a basse temperature e si dimostra selettivo su tutte le varietà di **Melo** e di **Pero**.

MODALITÀ D'USO

MACCANI® deve essere applicato preventivamente, si consiglia di impiegarlo nelle fasi e nelle condizioni favorevoli agli attacchi fungini, intervenendo in relazione alla pressione della malattia e all'andamento delle precipitazioni. Coerentemente con le linee guida fissate a livello internazionale dal FRAC, il comitato che si occupa di prevenire il rischio di insorgenza di patogeni resistenti ai fungicidi, si consiglia di utilizzare **MACCANI®**:

- Su **Melo** per un massimo di 3 trattamenti a stagione.
- Su **Pero**, in una strategia di alternanza con altri prodotti a diverso meccanismo d'azione, in blocchi di massimo 2 trattamenti consecutivi.

AVVERTENZE

MACCANI® è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Per favorire una migliore dispersione del prodotto in soluzione acquosa, riempire metà serbatoio con acqua e mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria. Continuare ad agitare la soluzione ed aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.

COLTURA	PATOGENI	DOSE (g/hl)	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
MELO	Oidio, Ticchiolatura	167	2,5	Intervenire da fioritura a frutto noce	3-4*	35
PERO	Maculatura bruna, Ticchiolatura	167	2,5	Intervenire da fioritura a frutto noce	3-4*	35

* Se si eseguono 12 o più trattamenti all'anno contro la difesa della Ticchiolatura