

Domark® 125

Formulazione
Micro-Emulsione

NOVITÀ



Fungicida sistemico in emulsione olio/acqua
ad ampio spettro d'azione

Composizione

Tetraconazolo (125 g/l) **11,6%**

Formulazione Emulsione olio/acqua

Confezioni 0,250 - 1 L

Registrazione n° 13065 del 12.10.2009

Tempo di carenza: Frumento e Orzo 35 gg., Barbabietola da zucchero 21 gg.; Vite, Melo, Pero, Pesco 14 gg.; Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchini, Carciofo 7 gg.; Peperone e Pomodoro 4 gg.

Caratteristiche

Domark® 125 è un fungicida sistemico a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione. Domark® 125 consente di ottenere il massimo della protezione con la più ampia elasticità d'impiego in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela con altri prodotti, in funzione del programma di trattamenti adottato.

Indicazioni di rischio

nc
NON CLASSIFICATO

Prodotto disponibile anche con il marchio **Scirocco® 125 EW.**

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (ml/ha)	Note
Vite	Oidio	20-25 (240 ml/ha)	Trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12-14 giorni. Attività collaterale contro <i>Guignardia bidwelli</i> (Marciume nero).
Melo, Pero	Ticchiolatura	30 (300 ml/ha)	Trattare ogni 7 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione primaria e fino alla fase di frutto nocce; proseguire successivamente con intervalli di 10 giorni fra ciascuna applicazione. Trattamenti curativi: intervenire entro le 72-96 ore successive alla pioggia infettante. Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): eseguire 2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni e quindi proseguire con le cadenze normali. Si consiglia l'impiego in miscela con un prodotto di copertura.
Melo	Oidio	16-24 (190-290 ml/ha)	Trattamenti primaverili ed estivi distanziati di 12-14 giorni.
Pesco	Oidio	30 (300 ml/ha)	Iniziare i trattamenti alla caduta dei petali ripetendo le irrorazioni ad intervalli di 12-14 giorni nelle aree ad elevata pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili. Dove l'incidenza della malattia è minore intervenire ogni 14-21 giorni.
Cucurbitacee (Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchini)	Oidio	50 (400 ml/ha)	Alla comparsa dei primi sintomi della malattia intervenire eseguendo 2-3 trattamenti distanziati di 10-15 giorni.
Carciofo	Oidio	20-30 (200-300 ml/ha)	Trattare alla prima comparsa della malattia ripetendo le applicazioni ogni 15 giorni se necessario.
Peperone	Oidio	20-35 (200-350 ml/ha)	Alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2-3 trattamenti ogni 12-15 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8-10 giorni.
Pomodoro (in campo)	Oidio	20-40 (200-400 ml/ha)	Alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2-3 trattamenti ogni 12-15 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8-10 giorni.
	Cladosporiosi	40-60 (400-600 ml/ha)	
Cereali (Frumento, Orzo)	Oidio, Ruggini, Septoriosi, Rincosporiosi	0,9-1 l/ha	Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni utilizzando un volume d'acqua di 200-600 l/ha. Si devono di norma effettuare due applicazioni, rispettivamente allo stadio di 1-2 nodi ed all'inizio della spigatura, limitandosi ad una sola (in genere spigatura), in caso di minor pressione della malattia e sulle varietà meno sensibili.
Barbabietola da Zucchero	Cercospora, Oidio, Ramularia, Ruggine	0,8 l/ha	Utilizzare 400-600 l/ha di acqua. Si consiglia di dimezzare la dose se miscelato con prodotti a base di rame. Effettuare il primo trattamento alla comparsa dei sintomi, eseguendo poi 1-2 applicazioni distanziate di 21 giorni in funzione delle condizioni ambientali e meteorologiche.
Colture Ornamentali e da Fiore* (in serra, vivaio e pieno campo)	Oidio, Ticchiolatura, Ruggine, Alternaria		Interventi preventivi distanziati di 7-14 giorni. *Consultare l'etichetta per le specie vegetali autorizzate e le dosi specifiche.
Ippocastano	Guignardia	20-40	
Quercia (vivaio, giovani impianti)	Oidio	20-40	
Pioppo	Ruggini	50-60	Irrorare bene anche la parte alta della chioma. Ripetere se necessario 15-20 giorni dopo la prima applicazione.

Vantaggi

Elevata attività sistemica. Efficacia prolungata. Ampio spettro d'azione. **Import tolerance USA. Ottima efficacia collaterale su Black-Rot (marciume nero) della vite.** Nuova formulazione ad elevata attività e sicura per l'operatore.

Fitotossicità

Considerando l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa, per le ornamentali è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

Domark® 125: marchio registrato e prodotto originale Isagro Spa.