



# OPINION ECNA

FUNGICIDA AD ATTIVITÀ PREVENTIVA  
E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO



CONFEZIONE

Flacone da 0,5 L  
(20x500 mL)



Fungicidi

| COLTURA                       | PATOLOGIA                                                                            | DOSI           | NOTE                                                                              | INTERVALLO DI SICUREZZA |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vite                          | Oidio                                                                                | 8 mL/hL        | Interventi in pre-fioritura                                                       | 35 giorni               |
|                               |                                                                                      | 15 mL/hL       | Interventi post-fioritura                                                         |                         |
| Frumento, orzo, segale, avena | Oidio, Ruggini, Septoria, Rincosporiori, Elmintosporiosi, Cercosporiella e Fusariosi | 0,5 L/ha       | In presenza di forti attacchi la dose può essere alzata a 0,6 l/ha                | 30 giorni               |
| Pesco e nettarina             | Oidio                                                                                | 15-20 mL/hL    |                                                                                   | 14 giorni               |
|                               | Bolla                                                                                | 30-40 mL/hL    | Per i trattamenti "al bruno"                                                      |                         |
|                               | Monilia                                                                              | 20-25 mL/hL    | Da bottoni rosa                                                                   |                         |
|                               | Marciume dei frutti                                                                  | 25 mL/hL       | Applicare in prossimità della raccolta                                            |                         |
| Albicocco                     | Monilia                                                                              | 25 mL/hL       |                                                                                   | 14 giorni               |
| Rosa                          | Oidio                                                                                | 12-15 mL/hL    | interventi ripetuti possono causare un rallentamento della crescita della coltura | -                       |
| Tappeti erbosi                | Sclerotinia, Elmintosporiosi, Oidio, Ruggini                                         | 1,6 L/ha       | eseguire applicazioni cadenzate ogni 10-21 giorni                                 | -                       |
| Riso                          | Elmintosporiosi                                                                      | 0,5 - 0,6 l/ha | Se necessario ripetere il trattamento dopo 1 mese                                 | 21 giorni               |

## COMPOSIZIONE

Propiconazolo puro 23,1% (250 g/L)

## FORMULAZIONE

Emulsione concentrata

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Nc - Non classificato



N - Pericoloso per l'ambiente

## N. REGISTRAZIONE

Reg. n. 15041 del 23-03-2011