

# METHAM NA 51

## SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO

<b>Composizione</b>	Metham sodio* g 42,8 (510 g/l)
<b>Formulazione</b>	Liquido fumigante
<b>Classificazione</b>	Corrosivo
<b>Registrazione</b>	N. 9298 del 28/08/1997
<b>Confezione</b>	25 L - 210 L - 1000 L

**METHAM NA 51** è un fumigante liquido che si utilizza su terreno nudo per trattamenti a terreni destinati alla semina o al trapianto di numerose colture. Il prodotto deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. È efficace nei confronti dei principali funghi del terreno responsabili delle varie forme di marciumi.

\*Sostanza attiva originale TAMINCO – prodotto FMC crop

## Trattamento per coltura

COLTURA	DOSE	TEMPO di CARENZA
<p><b>TERRENO NUDO PER TRATTAMENTI A TERRENI DESTINATI ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO</b> di lattuga e simili, riso, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee, carote, ortaggi a tubero e a stelo, patate, tabacco, ripristino di vigneti e frutteti, fiori</p>	<p>700 l/ha. In presenza di terreni pesanti o infettati da Verticillosi, Fusariosi e Fialoforosi, la dose dovrà essere aumentata fino a 1000-1300 l/ha, come pure andrà maggiorata in caso di impiego con bassa temperatura.</p>	<p>non previsto</p>

### AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto deve essere impiegato da solo. È fitotossico per tutte le colture e deve essere impiegato su terreno nudo almeno tre-quattro settimane prima della semina o del trapianto. Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e bestiame.

Dopo il trattamento irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre.

