

Gerephon SL (Etefon 39.6%)

fitoregolatori / diradanti

Caratteristiche



Il prodotto é un fitoregolatore di sintesi che dopo essere stato assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che la pianta già produce, é in grado di stimolare la maturazione dei frutti. Indicato per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti nel **pomodoro da industria** e nel **pomodoro da mensa**. Nel melo si impiega, in fioritura come diradante, in fase di accrescimento per indurre un effetto di riduzione della vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell'anno successivo, in pre raccolta per anticipare la raccolta e in post raccolta per rallentare la vegetazione ed accelerare la lignificazione favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste. L'impiego sul **tabacco** risulta particolarmente vantaggioso in quanto é in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.

Formulazione

Liquida

Composizione

Etefon puro g 39,6

Coformulanti q.b. a g 100

Numero di registrazione

Reg. N° 13931 del 02.10.2007 del Min. Salute

Avvertenze

Data la variabilità delle condizioni operative locali che possono influire sui risultati del trattamento, se ne consiglia l'impiego dopo aver effettuato saggi sperimentali o su consiglio degli Organi Ufficiali preposti

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Fra di Rischio: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini -

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e

proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non

disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

Confezioni

FLACONI

12 x 1000 ml



Campi d'impiego



Dosi e modalità d'impiego

| Impiego | Dosaggio | Trattamento | |
|---------|-----------------------------|--------------|---|
| Melo | in preraccolta | 40-50 ml/hl | Cultivar precoci, trattare 14 giorni prima della prevista raccolta. Impiegare il prodotto sempre in associazione ad un anticascola. Raccogliere 14 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. |
| Melo | in preraccolta | 80-100 ml/hl | Cultivar medio tardive, trattare 15-20 giorni prima della raccolta. Impiegare il prodotto sempre in associazione ad un anticascola. Raccogliere 14 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. |
| Melo | dopo la raccolta dei frutti | 50-70 ml/hl | Per rallentare la vegetazione della pianta ed accelerarne la lignificazione, favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste. |
| Melo | diradamento | 20-50 ml/hl | Da solo o in miscela con diradanti in fioritura. |
| Melo | in fase di accrescimento | 20-50 ml/hl | Applicazioni ripetute con GEREPHON SL da solo inducono un effetto di riduzione della vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell'anno successivo. |