



# TIOWETTING-DF

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO  
IN MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

- **Per la difesa della vite e di altre colture dall'oidio o "mal bianco"**, lo zolfo agisce nei confronti del patogeno causando la rottura della parete cellulare ed alterando i processi enzimatici della cellula.
- Attività esaltata da **temperature** relativamente **elevate** e da **umidità** dell'aria su valori limitati.
- La nuova formulazione e le particolari caratteristiche delle sue particelle (purezza, dimensione, ecc.) consentono l'utilizzo **a dosi elevate**, assicurando una elevata protezione della coltura ed una più prolungata persistenza d'azione.



Applicazione  
sulla pianta



## COMPOSIZIONE

ZOLFO\* (esente da Selenio) g 80  
(\*Prodotto originale AGROSTULLN)



## FORMULAZIONE

Microgranuli idrodispersibili



## REGISTRAZIONE

n. 9724 del 03/09/1998



## CONFEZIONI

kg 1 (Cartone: 10x1)  
kg 10 - kg 25



## CLASSIFICAZIONE

CLP Non classificato



## CARENZA

5 giorni



## MISCIBILITÀ E AVVERTENZE

Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, oli minerali e Diclofuanide. Il prodotto deve essere irrorato ad almeno tre settimane di distanza dall'applicazione di olii minerali.



## COLTURE



## PATOGENI



## DOSE



## NOTE

VITE	Oidio (Uncinula necator)	200-400 g/hl 600-800 g/hl 1200 g/hl	Zone a bassa pressione Zone ad alta pressione Infezioni oidiche in atto
POMACEE	Oidio (P. leucotrica)	300-500 g/hl 200-300 g/hl	Trattamenti in pre-fioritura Trattamenti in post-fioritura
DRUPACEE	Oidio (S. pannosa, P. triadactyla)	200-400 g/hl	Trattamenti in pre e post-fioritura
AGRUMI, OLIVO	Oidio	200-400 g/hl	Alla comparsa dei sintomi
FRAGOLA	Oidio (S. macularis)	200-500 g/hl	Alla comparsa dei sintomi
ORTAGGI, PATATA	Oidio (E. cichoracearum, E. poligoni, S. fuliginea, ecc.)	200-500 g/hl	Alla comparsa dei sintomi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Oidio (M. betae)	6-8 kg/Ha	Alla comparsa dei sintomi
CEREALI	Oidio (E. graminis)	6-8 kg/Ha	Alla comparsa sulle due ultime foglie del culmo
GIRASOLE, TABACCO, SOIA	Oidio (E. cichoracearum)	4-6 kg/Ha	
VIVAI DI PIOPPPO	Oidio	200-400 g/hl	
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI	Oidio	150-400 g/hl	