



ARMICARB® 85

FUNGICIDA A BASE DI BICARBONATO DI POTASSIO
IN POLVERE SOLUBILE

- Impiegabile anche in **agricoltura biologica**.
- Favorisce l'**innalzamento del pH** aumentando la pressione osmotica delle superfici fogliari e creando condizioni sfavorevoli alle spore fungine.
- **Elevata adesività** alle superfici trattate e una notevole resistenza al dilavamento, rispetto ai comuni bicarbonati.
- Umidità notturna o rugiada tendono a riattivare il prodotto e garantire un **effetto duraturo**.



Applicazione
sulla pianta

COMPOSIZIONE

BICARBONATO DI POTASSIO g 85
COFORMULANTI q. b. a g 100

REGISTRAZIONE

n. 15722 del 24/07/2013

CLASSIFICAZIONE

CLP Non classificato

FORMULAZIONE

Polvere solubile

CONFEZIONI

kg 1 - kg 5

CARENZA

Sospendere i trattamenti **1 giorno prima** della raccolta
SU TUTTE LE COLTURE no LMR no RESIDUI

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Non miscelare con rame, concimi solubili o con soluzioni alcaline dolci. L'aggiunta di un bagnante adesivo non è necessaria. Non miscelare con prodotti aventi la formulazione EC. Non modificare il pH della soluzione. Non utilizzare cloruro di calcio nel piano di trattamento. **Si consiglia di non utilizzare il prodotto ad un dosaggio ettolitro superiore allo 0,5% (500 g/hl).**

COLTURE

PATOGENI

DOSE

NOTE

FRAGOLA	Oidio	3 kg/Ha	Applicare il prodotto preventivamente e alla comparsa dei primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 gg.
ZUCCHINO, CETRIOLO, CETRIOLINO	Oidio	3 kg/Ha	Applicare il prodotto preventivamente e alla comparsa dei primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 gg.
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE	Oidio	3 kg/Ha	Applicare preventivamente dallo stadio di prima foglia (BBCH10) fino a completa maturazione dei frutti (BBCH89). Ripetere le applicazioni ogni 7 giorni.
VITE	Oidio	5 kg/Ha	Impiegare il prodotto preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi di post fioritura e ripetere le applicazioni ogni 7-10 gg.
	Botrite	5 kg/Ha	Impiegare il prodotto preventivamente allo stadio di fioritura prima della chiusura grappolo, inizio invaiatura poi a seconda delle condizioni climatiche.
RIBES, UVA SPINA, LAMPONE	Oidio	5 kg/Ha	Applicare il prodotto preventivamente e alla comparsa dei primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 gg.
MELO, PERO	Ticchiolatura	5 kg/Ha	Applicare dallo stadio di frutto noce (BBCH73) fino a quando il frutto ha raggiunto metà della taglia finale (BBCH75). Ripetere le applicazioni ogni 8 giorni.
PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO	Monilia	5 kg/Ha	Applicare da quando il 90% dei frutti ha raggiunto la taglia commerciale (BBCH79) fino a completa maturazione (BBCH89). Ripetere le applicazioni ogni 8 giorni.
ORTAGGI, ERBE FRESCHE, ORNAMENTALI PORTA SEME	Oidio	3 kg/Ha	Applicare preventivamente e ripetere le applicazioni ogni 7-10 gg.
ROSA	Oidio	5 kg/Ha	Applicare preventivamente nell'intervallo compreso tra BBCH 41-49 per applicazioni fogliari e nell'intervallo tra BBCH 51-59 per applicazioni sul bocciolo. Ripetere le applicazioni ogni 7 giorni.

© Marchio registrato CHURCH & DWIGHT Co.-USA