



SPIROX

FUNGICIDA LIQUIDO A BASE DI SPIROXAMINA

**Composizione:**

Spiroxamina pura (= 500 g/l) 50 g

Coformulanti q.b a g 100

Contiene alcool benzilico e dodecilbenzensolfonato, sale monoetilamminico

Formulazione: Emulsione concentrata (EC)

CLP : H302+H332 - H315 - H317 - H318 - H410



PERICOLO

Registrazione: n.15911 del 18/12/2013

Confezioni - Flacone: 1 lt. (cartone 12 pz)

Colture	Avversità	Modalità di impiego	Intervallo di sicurezza
VITE DA TAVOLA	Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	Ad inizio germogliamento 1 trattamento ad una dose non inferiore a 0,4 litri/ha. Successivamente intervenire alla dose di 60 - 80 ml/hl. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (0,6-0,8 l/ha). Si consiglia l'impiego di SPIROX in un calendario preventivo con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti. Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti massimo 3 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioidici a differente meccanismo d'azione.	14 giorni
VITE DA VINO			35 gironi

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.