



Avvertenza: **ATTENZIONE**
 Indicazioni di pericolo:
H302 – H373 – H410 – EUH208 – EUH401

FORMULAZIONE: Emulsione acquosa	COMPOSIZIONE: Abamectina pura 1,75 g (18 g/l)	IRAC: 6	N. REGISTRAZIONE: 16464 del 15-10-2015
---	---	-------------------	--

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Arancio	Minatrice serpentina e Acari	40 ml/hl (0,4-0,8 l/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di minimo 7 giorni	10 giorni
Pera	Psilla	50-100 ml/hl (0,375-1,2 l/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di minimo 15 giorni	3 giorni
	Acari	80 ml/hl (0,6-0,96 l/ha)		
Melo	Acari	80 ml/hl (0,6-0,96 l/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di minimo 15 giorni	3 giorni
Vite da vino	Acari	50-100 ml/hl (0,5-1 l/ha)	Massimo 1 trattamento/anno	10 giorni
Vite da tavola	Acari	50-100 ml/hl (0,5-1,2 l/ha)	Massimo 1 trattamento/anno	10 giorni
Lattuga, Dolcetta, Valerianella, Gallinella, Scarola, Indivia (in pieno campo)	Minatrice fogliari, Acari	50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di minimo 7 giorni	7 giorni
Peperone (in pieno campo)	Acari	50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di minimo 7 giorni	3 giorni
Pomodoro	Acari	50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di minimo 7 giorni	3 giorni
Melanzana	Acari	50-80 ml/hl (0,15-0,8 l/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di minimo 7 giorni	3 giorni
Melone, Cocomero, Zucca	Acari	50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di minimo 15 giorni. Per trattamenti in serra, non trattare nel periodo invernale tra Novembre e Febbraio	3 giorni in serra
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (in serra)	Acari			3 giorni
Fragola (in serra)	Acari			3 giorni

MISURE DI MITIGAZIONE

Per proteggere gli organismi acquatici:

- Non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici di 10 metri per Vite da vino e da tavola;
- Non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici di 15 metri per Arancio;
- Non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici di 20 metri per Melo e Pera.

Per proteggere gli artropodi utili:

- Rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri per Arancio Pera e Melo;
- Rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri per Vite da vino e da tavola.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore o eliminare le piante infestanti prima della fioritura. Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori e di 14 giorni per l'introduzione di insetti utili.

