


FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE PER FRUTTIFERI, ORTICOLE, FLORICOLE E VITE

SCORE 25 EC è un fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione. Caratterizzato da prestazioni elevate, possiede spiccate proprietà preventive e curative ed è registrato su un ampio numero di colture.

FUNGICIDA



COMPOSIZIONE	INDICAZIONI DI PERICOLO	FORMULAZIONE	NUMERO DI REGISTRAZIONE
Difenoconazolo 23,23% (250 g/l)	N - pericoloso per l'ambiente	concentrato emulsionabile	8801 del 6.3.96

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Melo Pero	Ticchiolatura Oidio	15 ml/hl	Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni o curativi entro 100 ore dall'inizio della pioggia infettante, in miscela con un partner di copertura. I trattamenti contro la ticchiolatura controllano anche l'oidio	14 gg
Pesco	Bolla	30 ml/hl	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie a bottoni rosa, specie se si sono verificate abbondanti piogge nelle settimane seguenti alla rottura delle gemme. SCORE 25 EC possiede anche un'eccellente attività collaterale contro la monilia dei fiori	7 gg
	Monilia dei frutti		2 trattamenti, a 14 e a 7 giorni dalla raccolta. Il trattamento deve essere preventivo. Con varietà sensibili e in annate piovose far precedere SWITCH alla dose di 80 g/hl 21 giorni prima della raccolta	
Vite	Black Rot, Oidio	15-20 ml/hl	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni	21 gg
Barbabietola da zucchero	Cercospora	0,2-0,3	Iniziare i trattamenti in miscela con AMISTAR alla comparsa delle prime pustole e ripetere ad intervalli di 15-20 giorni Il trattamento di chiusura può essere effettuato con SCORE 25 EC da solo Effettuare al massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 gg	

COLTURE	PATOGENI	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Asparago	Ruggine (<i>Puccinia asparagi</i>) <i>Stemphylium vesicarium</i>	0,5	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni	7 gg
Patata Sedano Carota Cavolfiore	Alternariosi, Septoriosi, Ruggini, Oidio, Micosferella	0,4-0,5	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia	14 gg 21 gg 7 gg 14 gg
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5	3-4 trattamenti ad intervallo in circa 10 giorni	7 gg
	Alternariosi, Ruggini, Oidio, Septoriosi, Micosferella	0,4-0,5	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia	
Cetriolo	Oidio Alternariosi	0,5	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni	
Finocchio	Ramularia	0,5	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 8 giorni	3 gg
Rosa Garofano	Oidio, Ticchiolatura Ruggini	100 ml/ha	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici	—

CONFEZIONI


flaconi da **250 ml**
in cartoni da 20 pezzi

flaconi da **1 l**
in cartoni da 12 pezzi

