

INSETTICIDA E ACARICIDA AD AZIONE TRANSLAMINARE REGISTRATO SU UN AMPIO NUMERO DI COLTURE

VERTIMEC EC è un insetticida e acaricida translaminare con attività biologica elevata nei confronti dei parassiti.

Agisce per contatto e ingestione sugli stadi mobili di acari (ragnetto rosso ed eriofidi), psilla e minatrici di numerose colture.

INSETTICIDA E ACARICIDA



Frutta



Vite



Orticole



Floricole e
ornamentali

COMPOSIZIONE

Abamectina 1,84%
(18 g/l)

INDICAZIONI DI PERICOLO

Xn-nocivo
N - pericoloso per l'ambiente

FORMULAZIONE

concentrato emulsionabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE

8795 del 6.3.96

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	Dosi (ml/hl)	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO E NOTE		INTERVALLO DI SICUREZZA
Arancio Limone Mandarino Clementino	Minatrice serpentina	37,5	0,375-0,75	Alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere 250 ml/ha di Break-Thru S240 oppure 0,5% di olio minerale	10 gg
		75	0,75	Alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione		
	Ragnetti rossi	75	0,75 - 1,5	Alla comparsa dei primi stadi mobili		
Pero Melo	Psilla	75	1 - 1,5	Trattamento fondamentale: uova gial- le/prime neanidi della 2ª generazione (in genere nel mese di maggio)		14 gg pero
	Ragnetti rossi Eriofide del melo Cemistoma Litocollete		0,75 - 1	Entro 2 settimane da caduta petali		28 gg melo
Pesco e Nettarine	Ragnetto rosso Eriofidi	75 - 100	0,75 - 1,3	Alla comparsa delle prime forme mobili	Per i trattamenti estivi si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0,1%) o di idoneo coadiuvante	14 gg
	Larve di tripide			A caduta petali o in presenza delle prime punture su frutti; ripetere se necessario dopo 7-10 giorni l'applicazione		
Vite	Ragnetti rossi Ragnetto giallo della vite	75	0,75	Alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie		28 gg
	Tignoletta Tignola	55-75	0,5 - 0,75	Da inizio ovideposizione a due settimane dopo		

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Quando necessario per il trattamento, dosare l'eventuale aggiunta di olio minerale in percentuale sugli ettoltri di acqua realmente utilizzati e non sull'ettaro.

Per le applicazioni in endoterapia, seguire le indicazioni specifiche in etichetta.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	Dosi (ml/hl)	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO E NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Cetriolo Melone Peperone Melanzana Pomodoro Cocomero Sedano	Ragnetto rosso Eriofide	60	0,6 - 1	Alla comparsa dei primi stadi mobili	3 gg cetriolo cocomero melone peperone
	Larve di tripide	75	0,75 - 1,2	Alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari	60	0,6 - 1	Alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	7 gg melanzana pomodoro 10 gg sedano
Lattughe e simili Rucola	Minatrici fogliari	60	0,6 - 1	Alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto	14 gg
	Larve di tripide			Alla comparsa delle prime larve	
Fragola	Ragnetto Rosso	40	0,5	Alla comparsa dei primi stadi mobili, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	7 gg
		100	1,2	Alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione	
	Larve di tripide	75	0,75 - 1,2	Alla comparsa delle prime larve	
Lampone Mora	Ragnetti rossi	75	0,75 - 1,2	Alla comparsa dei primi stadi mobili	
Ornamentali e floricole in terra e in vaso Vivai di arbustive ed arboree	Minatrici fogliari	50	0,5 - 1,5	Alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni	—
	Ragnetto rosso	25 - 50	0,5 - 1,5	Alla comparsa dei primi stadi mobili	
	Larve di tripide	75	0,75 - 1,5	Alla comparsa delle prime larve	
Latifoglie Conifere per alberature stradali e parchi (endoterapia)	Minatrici fogliari Processionaria del pino	10 - 40 ml / l		Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura Iniettare in presenza delle prime larve neonate	
	Tingide del platano Afdi Acarì tetranichidi ed eriofidi			Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante	
Palme Ornamentali in campo, aree urbane, vivai (endoterapia) (●)	Punteruolo rosso delle palme	25 - 50 ml / l		Iniettare il prodotto a partire dai primi voli degli adulti	

(●) In attesa della registrazione definitiva

CONFEZIONI

flaconi da **250 ml**
in cartoni da 20 pezzi

flaconi da **1 l**
in cartoni da 12 pezzi

taniche da **5 l**
in cartoni da 4 pezzi

