



BANJO®

FUNGICIDA DI COPERTURA PER MELO, VITE E PATATA



Fungicidi

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Melo	Ticchiolatura	100 mL/hL	Dalla ripresa vegetativa a frutto noce intervenire ogni 6-10 giorni. Dopo frutto noce, in funzione della pressione della malattia, l'intervallo tra i trattamenti può essere ampliato a 14 giorni	60 giorni
	Alternaria	70-100 mL/hL	Intervenire nelle condizioni di maggior suscettibilità per la malattia	
Vite da vino	Botrite	100-150 mL/hL	Intervenire nelle condizioni di maggior pericolosità per la malattia (metodo fenologico)	28 giorni
Patata	Peronospora	300-500 mL/Ha	Intervenire prima della comparsa della malattia (normalmente quando le piante hanno raggiunto i 10-15 cm di altezza), ripetendo il trattamento ogni 6-10 giorni, in funzione della piovosità	7 giorni

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



COMPOSIZIONE

Fluazinam 40,2% (500 g/L)

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

INDICAZIONI DI PERICOLO



Xi - Irritante



N - Pericoloso per l'ambiente

N. REGISTRAZIONE

Reg. n. 13905 del 09-12-2010