

EVITA DANNI DA BRUCATURA



NOVITA'

TRICO®

Repellente
CONTRO
CERVI-CAPRIOLI
DAINI-CAMOSCI

L'UNICO CHE PROTEGGE VERAMENTE



VITE



POMACEE



FORESTE



**COLTURE
ESTENSIVE**

- **Effetto repellente di lunga durata.**
- **Resistente al dilavamento.**
- **Ottima aderenza alla vegetazione.**
- **Origine naturale.**
- **Applicabile con Irroratrici, Atomizzatori, Pompe a spalla, Pennello.**
- **Utilizzabile tutto l'anno.**
- **Fitosanitario Registrato presso Ministero Salute.**
- **Classe "Non Classificato".**



Distributore esclusivo: SEPRAN S.R.L.
Via Brenta 20 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 976562 Fax 0444 976985

E.Mail: info@sepran.com - Sito Internet: www.sepran.com

Kwizda

Agro seed treatment

EVITA DANNI DA BRUCATURA

TRICO®

NOVITA'

Repellente contro Cervi, Daini, Caprioli e Camosci L'UNICO CHE PROTEGGE VERAMENTE



COMPOSIZIONE : Grasso di pecora 6,39%
FORMULAZIONE : Liquido emulsionabile.
CONFEZIONI : Flacone LT. 1 - Tanichetta LT.5 - Tanica LT.10
REGISTRAZIONE : Prodotto Fitosanitario.
Reg. n.14891 del Ministero della Salute.
Classe "Non classificato".

COS'E' / COME FUNZIONA

TRICO è un repellente sviluppato da Kwizda-Agro che agisce sull'olfatto di CERVÌ, DAINI, CAPRIOLI E CAMOSCI risultando al tempo stesso **INODORE PER L'UOMO**.

La formulazione oleosa a base acqua contiene grasso di pecora come sostanza attiva repellente. **TRICO rende la VEGETAZIONE TRATTATA NON GRADITA A CERVÌ, DAINI, CAPRIOLI E CAMOSCI**, evitando così danni da brucatura. È utilizzabile su **VITE - POMACEE (MELO, PERO, ecc.) - FORESTE (ABETI, PINI, PIANTE A FOGLIA CADUCA, ecc.) e SU COLTURE ESTENSIVE DI MAIS, SOIA, GIRASOLE e COLZA**.

VANTAGGI:

TRICO aderisce ottimamente alla vegetazione, **RESISTE AL DILAVAMENTO** ed esercita la sua azione repellente per lungo tempo. E' utilizzabile tutto l'anno ed è applicabile con **IRRORATRICI, ATOMIZZATORI, POMPE A SPALLA e PENNELLO**. **Contiene TRACCIANTE che rende individuabile la vegetazione trattata**. È di **ORIGINE NATURALE** senza alcuna aggiunta di sostanze pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente e risulta pertanto perfettamente **ECO-COMPATIBILE**.

MODALITÀ, DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

FORESTE (ABETI, PINI, PIANTE A FOGLIA CADUCA, ecc.): TRICO si impiega tal quale trattando, soprattutto, le punte vegetative. Si raccomandano 2 applicazioni: la prima in autunno-inverno e la seconda in primavera alla ripresa vegetativa alla dose di 10-20 Litri di prodotto non diluito ad Ha.

VITE: 10-15 Litri di TRICO sono da applicare in 1 Ha. Il prodotto va diluito con proporzione da 1/3 (cioè 1 Litro di prodotto + 3 Litri d'acqua) a 1/5 (cioè 1 Litro di prodotto + 5 Litri d'acqua). **OVVERO** il prodotto va diluito alla dose di 20 Litri di prodotto + 80 Litri d'acqua. La miscela così ottenuta va applicata alla dose di 50 Litri ad Ha per la prima applicazione e 75 Litri ad Ha per la seconda applicazione. Le viti vanno trattate allo stadio BBCH 13 (3 foglie) e BBCH 61 (inizio fioritura). Due trattamenti con un intervallo di 28-48 giorni sono sufficienti per tutto il periodo primaverile.

POMACEE (Melo, Pero, ecc.): TRICO va diluito alla dose di 15-20 Litri di prodotto in circa 75 Litri di acqua. **OVVERO** il prodotto va diluito alla dose di 20 Litri di prodotto + 80 Litri d'acqua. La miscela così ottenuta va applicata alla dose di circa 75 Litri di miscela ad Ha in fase di apertura delle gemme (stadio BBCH 07). Questa applicazione previene danni da brucatura.

COLTURE ESTENSIVE (Mais, Soia, Girasole e Colza):

TRICO va diluito alla dose di 15 Litri di prodotto in 200-300 Litri di acqua.

OVVERO il prodotto va diluito alla dose di 15 Litri di prodotto + 185-285 Litri di acqua. La miscela così ottenuta (200-300 Litri) va applicata sulla superficie utilizzando una normale barra irroratrice. Quattro trattamenti negli stadi compresi fra BBCH 13 (2-3 foglie) BBCH 61 (inizio fioritura), con intervalli di 7-14 giorni fra i trattamenti prevengono danni da brucatura alle colture.

Nota: questa locandina costituisce unicamente una presentazione del prodotto: prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze riportate sull'etichetta del prodotto.



Esempio applicazione su vite con pompa a spalla



Esempio foglia di vite trattata



Esempio applicazione su vite con atomizzatore



Esempio applicazione su pino con pompa a spalla



FLACONE 1 LT
per 500-1.000 m²

(a seconda della coltura e dell'epoca d'impiego)



TANICHETTA 5 LT
per 2.500-5.000 m²

(a seconda della coltura e dell'epoca d'impiego)



TANICHETTA 10 LT
per 5.000-10.000 m²

(a seconda della coltura e dell'epoca d'impiego)



Distributore esclusivo: **SEPRAN S.R.L.**
Via Brenta 20 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 976562 Fax 0444 976985

E.Mail: info@sepran.com - Sito Internet: www.sepran.com

Kwizda

Agro seed treatment