



PROGERBALIN LG

REGOLATORE DI CRESCITA LIQUIDO SOLUBILE



CARATTERISTICHE

Il **PROGERBALIN LG** è un formulato a base della associazione delle gibberelline A4-A7 con la 6-Benziladenina. I due regolatori di crescita delle piante, influenzano in modo positivo i processi fisiologici di melo e pero con un incremento della qualità e della produzione.

COMPOSIZIONE

Gibberelline A4 e A7 pureg 1,8 (=18,8 g/l)
(isomero A4 + A7)
Benziladenina purag 1,8 (=18,8 g/l)
Coadiuvanti.....q.b. a g 100

Reg. n. 11183 del 05-02-2002 del Min. della Salute

MODALITÀ DI IMPIEGO

MELO

Miglioramento della forma e prevenzione della rugginosità

Effettuare il primo trattamento alla dose di 30 ml in piena fioritura e proseguire con altri 3 trattamenti alla dose di 25 ml/hl ogni 7 giorni.

Gruppo Delicious Rosse: Miglioramento della forma

Impiegare 70-100 ml/hl trattando tra il 30% di fiori aperti e la caduta petali preferibilmente in due applicazioni di 35-50 ml/hl ciascuna ad intervalli di 5-7 giorni.

Gruppo Gala - Favorisce il miglioramento della forma, anticipa l'emissione e lo sviluppo dell'apparato fogliare, migliora l'omogeneità della fioritura, incrementa la quantità raccolta al primo stacco.

Effettuare 4 applicazioni a distanza di 10-12 giorni con 25 ml/hl ad iniziare in pre-fioritura (orecchiette di topo/mazzetti). Nel caso che il momento di applicazione dovesse coincidere con quello del diradamento è bene anticipare o posticipare il trattamento con Progerbalin in modo da mantenere alcuni giorni di distanza dal trattamento diradante.

Anticipo di branchette su astoni di melo non in produzione e vivai

trattare a 4,5 - 5,5 l per ettaro equivalenti a 2,5 l/hl, su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm che siano in piena crescita e con buon apparato fogliare. Bisogna effettuare in modo preciso la bagnatura della zona apicale (i 30 cm superiori della pianta).

PERO

per il miglioramento dell'allegagione impiegando 60-80 ml/hl all'inizio della fioritura o, preferibilmente, con due applicazioni alla dose di 30-40 ml/hl effettuando il primo trattamento quando si hanno il 25% circa dei fiori aperti ed il secondo dopo circa 2-3 giorni.

AVVERTENZE

La quantità finale di soluzione per ettaro deve essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento - trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio - non effettuare l'eventuale diradamento prima di 4 - 5 giorni dall'ultimo trattamento.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con i bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile. Durante la preparazione delle miscele è opportuno aggiungere il PROGERBALIN LG, nella dose richiesta, per ultimo. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).



I- 16013 Campo Ligure (GE) Via Vallecaldà, 33
Tel.: +39 010 920 395 Fax : +39 010 921 400
e-mail: info@lgobbi.it http://www.lgobbi.it
SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

l. gobbi s.r.l.

Conc. E. Gerlach GmbH - Germania

