

## FUNGICIDI

# Protil® EC

**Fungicida sistemico  
a largo spettro d'azione**

Registrato anche su Vite



### Composizione

**Propiconazolo** puro (250 g/l) **23,1%**

**Formulazione** Emulsione concentrata

**Confezioni** 0,5 - 2,5 L

**Registrazione** n° 10426 del 29.03.2000

**Tempo di carenza:** Pesco, Albicocco 14 gg.; Riso 21 gg.; Frumento, Orzo, Segale, Avena 30 gg.; Vite 35 gg.

### Caratteristiche

**Protil® EC** è un fungicida sistemico a prevalente azione antioidica.

Viene assorbito rapidamente dai tessuti vegetali ed è quindi poco esposto al dilavamento.

La sua sistemica si manifesta in modo acropeto, è dotato di lunga persistenza ed ha azione preventiva, curativa ed eradicante.

Indicazioni di rischio



### Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (ml/ha)	Note
Vite	Oidio	8 (max 80 ml/ha)	Pre-fioritura, interventi ogni 14 giorni.
		15 (max 150 ml/ha)	Post-fioritura, interventi ogni 14 giorni.
Pesco, Nettarina	Oidio	15-20	A partire dalla scamicatura, ogni 10-12 giorni in relazione al decorso della malattia.
	Bolla	30-40 (0,3-0,4 l/ha) 20-25 (0,2-0,25 l/ha)	Interventi in autunno-inverno. Dai bottoni rosa in poi.
Pesco, Nettarina, Albicocco	Moniliosi	25 (0,25 l/ha)	Pre e post-fioritura ( <i>Monilia laxa</i> ). Pre-raccolta ( <i>Monilia fructigena</i> ).
Frumento, Orzo, Segale, Avena	Oidio, Ruggini, Septoria, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, <i>Pseudocercospora</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Cladosporium</i>	0,5-0,6 l/ha	Intervenire alla levata ed in fioritura (limitandosi a quest'ultima in caso di attacchi meno pericolosi). Nell'orzo a semina autunnale può rendersi necessario un intervento in autunno.
Riso	Elmintosporiosi	0,5-0,6 l/ha	Intervenire alla prima comparsa dei sintomi. Se necessario ripetere il trattamento dopo un mese.
Rosa	Oidio	15 (150-300 ml/ha)	Interventi ogni 12-14 giorni.
Tappeti erbosi	Sclerotinia, Oidio, Ruggini	100-200 (max 1,6 l/ha)	Intervenire ogni 10-20 giorni.

### Vantaggi

**Prontezza d'azione e persistenza. Efficacia prolungata. Largo spettro d'azione.**

### Compatibilità

Non è miscibile con prodotti a reazione alcalina.

### Fitotossicità

Non trattare in fioritura. In alcuni casi potrebbero manifestarsi fenomeni di sensibilità varietale. Su Rosa e Tappeti erbosi effettuare saggi varietali preliminari.

### Avvertenze

T trattare nelle ore più fresche della giornata. Non rientrare nelle aree trattate per 24 ore dopo il trattamento.

**Protil® EC:** marchio registrato Gowan Italia. Prodotto originale Makhteshim Agan.