

## Gerlagib LG (GA4-7 1%)

fitoregolatori / stimolanti

Caratteristiche

---



GERLAGIB LG è un fitoregolatore che trova interessanti campi d'impiego su alcune cultivar di melo e pero. In determinate situazioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al Gruppo Delicious rosse, sia normali che Spur, tendono ad assumere una forma schiacciata. GERLAGIB LG provoca una modifica della forma (allungamento) secondo gli standard varietali tipici delle zone più vocate. GERLAGIB LG sulle mele della varietà Golden Delicious riduce o previene significativamente la rugginosità, fisiopatia che causa un importante deprezzamento della produzione. Il prodotto ha dimostrato di diminuire i danni da gelo e quindi di aiutare l'allegagione nei casi di gelate durante la fioritura.

Formulazione

---

Liquida

Composizione

---

Gibberelline A4-A7 g 1

Coformulanti q.b. a g 100

Numero di registrazione

---

Reg. n° 11185 del 05.02.2002 del Min. della Salute

Avvertenze

---

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Confezioni

---

FLACONI

12 x 1000 ml

Campi d'impiego

---



Dosi e modalità d'impiego

---

Impiego	Dosaggio	Trattamento
MELO Gruppo Delicious rosse	100-130 ml/hl (singola applicazione)	Per il miglioramento della forma. Trattare tra l'80% di fiori aperti e la caduta dei petali.
MELO Gruppo Delicious rosse	50-80 ml/hl (due applicazioni) a 7 - 10 giorni di distanza	Per il miglioramento della forma. Trattare tra l'80% di fiori aperti e la caduta dei petali.
MELO Golden Delicious	40-50 ml/hl	Per la prevenzione della rugginosità. Effettuare il primo trattamento a fine fioritura e successivamente altre 2-3

			applicazioni ad intervalli di 7-10 giorni.
MELO	Gruppo Gala	30-40 ml/hl	Per favorire il miglioramento della forma, anticipare l'emissione e lo sviluppo dell'apparato fogliare, migliorare l'omogeneità della fioritura, incrementare la quantità raccolta al primo stacco. Effettuare 4 applicazioni a distanza di 10-12 giorni ad iniziare dalla pre-fioritura (orecchiette di topo/mazzetti).
MELO	Altre varietà	50-60 ml/hl	Durante la fioritura ripetuto per 2 volte.
PERO		80-100 ml/hl (singola applicazione)	Per migliorare l'allegagione. Applicare il prodotto all'inizio della fioritura.
PERO		30-50 ml/hl (due applicazioni)	Per migliorare l'allegagione. Effettuare il primo trattamento al 30-40% di fiori aperti ed il secondo entro 2-3 giorni.