

POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO

INSETTICIDA - FUNGICIDA IN FORMULAZIONE LIQUIDA.



Autorizzato in agricoltura biologica

Registrazione n. 909 del 22/02/1973

Composizione: Polisolfuro di calcio 30.0% (pari a 380.0 g/l)

Indicazione di pericolo:

Tossicologica: irritante (Xi)

Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)

Chimico-Fisica: --

REGISTRAZIONI DEL PRODOTTO

Melo

Intervallo di sicurezza: 30 giorni

Oidio del Melo

Dose di impiego: 1-2 kg/hl

Consigli d'uso: Eseguire dei trattamenti primaverili-estivi. Effettuare dei trattamenti nelle seguenti fasi: nella fase pre-fiorali con una dose di 2 Kg/hl, nei trattamenti primaverili, da ingrossamento gemme a bottoni fiorali. Nella fase post-fiorali alla dose di 1,5 Kg/hl; successivamente con una dose di 1 Kg/hl. Non somministrare con temperature superiore a 30gradi C.

Ticchiolatura

Dose di impiego: 1-2 kg/hl

Consigli d'uso: Eseguire dei trattamenti primaverili-estivi. Effettuare dei trattamenti nelle seguenti fasi: nella fase pre-fiorali con una dose di 2 Kg/hl, nei trattamenti primaverili, da ingrossamento gemme a bottoni fiorali. Nella fase post-fiorali alla dose di 1,5 Kg/hl; successivamente con una dose di 1 Kg/hl. Non somministrare con temperature superiore a 30gradi C.