



# COPRANTOL® WG

**FUNGICIDA A BASE DI RAME, IN GRANULI IDRODISPERDIBILI,  
AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE**

## CARATTERISTICHE E CAMPI DI APPLICAZIONE:

COPRANTOL WG è un fungicida a base di rame ossicloruro ad ampio spettro d'azione. È caratterizzato da una formulazione in granuli idrodispersibili, che conferisce al prodotto vantaggi in fase di manipolazione, stoccaggio ed applicazione. Nelle fasi di manipolazione, il prodotto risulta facilmente dosabile e non produce polverosità; nella fase di stoccaggio mantiene molto a lungo le sue caratteristiche fisico-chimiche. La tecnologia di formulazione, innovativa e moderna, assicura granuli di dimensione ottimale ed uniforme. Ciò conferisce al prodotto un'ottima bagnabilità e sospensibilità nelle fasi di miscelazione e successivamente una elevata e costante attività fungicida.

### COMPOSIZIONE

Rame metallo da  
Ossicloruro 32%

### INDICAZIONI DI RISCHIO

N - pericoloso per l'ambiente

### FORMULAZIONE

granuli idrodispersibili

### NUMERO

DI REGISTRAZIONE

9758 del 30.9.98

## DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (g / hl)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Peronospora <i>Azione collaterale contro:</i> Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario	250 - 350 300 - 450	Trattamenti ogni 7-8 giorni in funzione preventiva, con andamenti stagionali normali. Con andamenti meteorologici molto piovosi.	20 gg
Pomacee: melo, pero, cotogno	Ticchiolatura, Monilia, Nectria, Septoriosi del pero, Batteriosi	600 - 700 250 - 300	Trattamenti autunno-invernali. Trattamenti primaverili-estivi.	
	Marciume del colletto	450 - 600	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	
	Colpo di fuoco batterico del pero	250 - 300	Trattamenti primaverili-estivi e autunnali.	
Drupacee: pesco, albicocco, ciliegio, susino Mandorlo	Bolla, Corineo, Monilia, Cancro delle drupacee	600 - 700	Trattamenti autunno-invernali.	
	Cancro batterico	500 - 600	Trattamenti alla caduta delle foglie.	
	Marciume del colletto del ciliegio	450 - 600	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	
Agrumi: arancio, limone, mandarino, clementine, bergamotto, cedro, pomelo, limetta, chinotto, tangerino	Antracnosi, Cancro gommoso Mal secco, Marciume o gommosi del colletto, Fumaggine <i>Azione collaterale contro:</i> Batteriosi	300 - 350	Intervenire quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.	
Olivo	Occhio di pavone, Fumaggine, Piombatura, Rogna, Lebbra	300 - 400	Trattare nei periodi più favorevoli alle malattie.	
Actinidia	Marciume del colletto	450 - 600	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	
Fragola	Marciume del colletto, Vaiolatura, Batteriosi	250 - 350	Trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa.	
Fruttiferi a guscio: noce, nocciolo, castagno Fruttiferi minori	Cancri rameali, Antracnosi, Batteriosi	500 250 - 300	Per trattamenti autunno-invernali. Per trattamenti estivi.	
Floricole Ornamentali	Antracnosi, Peronospora, Ruggine, Ticchiolatura, Batteriosi ( <i>Azione collaterale</i> )	300 - 350	Intervenire quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.	—

## ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Non trattare durante la fioritura.

**Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili** il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

**Varietà di melo cuprosensibili:** Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

**Varietà di pero cuprosensibili:** Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

**Su varietà poco note di colture orticole, floricole ed ornamentali** od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

**Preparazione della poltiglia:** diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COPRANTOL WG a base di Ossicloruro di rame si utilizza a basso dosaggio per ettaro; ciò significa minori quantità di ioni rame nell'ambiente e minore movimentazione di merce.  
Da applicare secondo i campi d'impiego in etichetta con funzione preventiva.


**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**

COLTURE	PATOGENI	Dosi (g / hl)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
<b>Ortaggi:</b> Bietola da orto e rossa	Cercospora, Ruggine	300 - 400	Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. Il trattamento esplica azione collaterale sulle batteriosi.	3 gg pomodoro melanzana
Carota	Alternariosi			
Rapa, Ravanello	Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora			
Aglione, Cipolla, Cipolline, Scalogno	Peronospora <i>Azione collaterale su:</i> Muffa grigia, Marciumi batterici			
Pomodoro	Cladosporiosi, Septoriosi, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero, <i>Azione collaterale su:</i> Muffa grigia, Alternariosi			
Peperone	Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine, <i>Azione collaterale su:</i> Muffa grigia, Marciume molle batterico, Alternariosi			
Melanzana	Vaiolatura dei frutti, Moria delle piantine, <i>Azione collaterale su:</i> Muffa grigia, Alternariosi			
Melone, Cocomero, Zucca, Zucchini, Cetriolo, Cetriolino	Maculatura angolare, Peronospora <i>Azione collaterale su:</i> Muffa grigia, Marciume molle batterico			
Cavoli	Peronospora, Ruggine bianca, Marciume nero, Marciume molle batterico, Micosferella <i>Azione collaterale su:</i> Muffa grigia, Alternariosi			
Asparago	Ruggine. <i>Azione collaterale su:</i> Muffa grigia			
Carciofo, Cardo	Peronospora della lattuga <i>Azione collaterale su:</i> Marciume molle batterico			
Finocchio, Sedano, Prezzemolo	Cercosporiosi e Septoriosi del sedano <i>Azione collaterale su:</i> Marciume molle batterico			
Altre orticole (escluso il porro)	Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi			
Cipresso	Cancro			950 - 1100
Patata	Alternariosi, Peronospora	3-3,5 kg/ha		3 gg
Oleaginose	Peronospora, Antracnosi			20 gg
Barbabietola da zucchero	Cercospora <i>Azione collaterale su:</i> Peronospora, Ruggine			
Tabacco	Batteriosi, Antracnosi, Peronospora			
Trattamento alla risaia	Alghe e Molluschi	3-3,5 kg/ha	Somministrare la dose quando l'acqua ha raggiunto i 10 cm.	—

Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato.

Le quantità indicate si intendono per 100 litri di acqua, se non diversamente specificato, e per trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture).

Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.



Registrazione Isagro Copper srl

**CONFEZIONI**

sacchetti da **1 kg**  
in cartoni da 12 pezzi

sacchi da **10 kg**

