



NIMROD® 250 EW

FUNGICIDA AD ATTIVITÀ PREVENTIVA
E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO



Fungicidi

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Oidio	0,8-1 L/Ha	Da inizio germogliamento a pre-fioritura	14 giorni
		1-1,5 L/Ha	A partire da pre-fioritura impiegare dose più alta in caso di infezioni appena iniziate	
Melo	Oidio	30-60 mL/hL	Impiegare da pre-fioritura (orecchiette di topo), ripetendo il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni	14 giorni
Pesco e albicocco		50-100 mL/hL	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni	14 giorni
Melone, cocomero, zucchini, cetriolo, cetriolino, zucca	Oidio	50-100 mL/hL	-	3 giorni
Fragola		1 L/Ha	-	3 giorni
Rosa		150-300 mL/hL	-	-
Pomodoro, melanzana e peperone	Oidio	200-300 mL/hL	Impiegare la dose più elevata in presenza di <i>Leveillula taurica</i>	3 giorni

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



Tanica da 5 L (4x5)



COMPOSIZIONE

Bupirimate puro 23,8% (250 g/L)

FORMULAZIONE

Emulsione acquosa

INDICAZIONI DI PERICOLO



Xi - Irritante



N - Pericoloso per l'ambiente

N. REGISTRAZIONE

Reg. n. 13771 del 02-04-2007