

RINGO MASSÓ

**Fungicida in formulazione granuli idrodispersibili
per il trattamento preventivo di ticchiolatura su melo e pero
Meccanismo d'azione: FRAC M09**

Composizione – 100 g di prodotto contengono:

Dithianon puro g 70
Coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE



INDICAZIONI DI PERICOLO

H302. Nocivo per ingestione. H317. Può provocare una reazione allergica cutanea. H319. Provoca grave irritazione oculare. H332. Nocivo se inalato. H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH066. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

EUH210. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102. Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261. Evitare di respirare la polvere. P270. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'uso. P280. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312. In caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni/un medico. P333+P313. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391. Raccogliere la fuoriuscita. P501. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Sharda Cropchem España, S.L.

Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3, 12th floor - 30006 Murcia, Spagna
Tel +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18771 del 21/10/2024

Distribuito da:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Succursale Italia: Viale Marelli, 132, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia
Tel: +39 02 0996 6107

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

Solfotecnica Italiana SpA, via G. Matteotti 16, 48121 Ravenna (Italia); **Hebei Xingbai Agricultural Technology Co Ltd**, Nanbaishe Bio Industrial Park, Zhao County, Hebei Province, Cina

Taglie: g 100 – 150 – 250 – 500; kg 1 – 2 – 5 – 10 – 20

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Applicazioni precoci: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 30 m da corpi idrici superficiali oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 75% oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 90%.

Applicazioni tardive: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 15 m da corpi idrici superficiali oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 50%.

L'operatore deve indossare indumenti protettivi (braccia, corpo e gambe coperte) e guanti durante le fasi di carico/miscelazione e applicazione durante le applicazioni con trattore, e senza guanti per le applicazioni manuali. Rientrare nell'area trattata dopo che siano trascorsi 10 giorni con indumenti protettivi e guanti o 17 giorni senza guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

RINGO MASSÓ contiene dithianon, una sostanza attiva appartenente al gruppo chimico degli antrachinoni (FRAC M09), con attività preventiva. Agisce per contatto inibendo vari processi metabolici su diversi enzimi.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

RINGO MASSÓ deve essere impiegato come indicato in tabella :

Coltura	Avversità controllate	Modalità di applicazione	Epoca di impiego	Dose [kg/ha]	Volume di acqua [L/ha]	PHI
Melo, Pero	Ticchiolatura (<i>V. inaequalis</i> , <i>V. pyrina</i>)	Spray	BBCH 53-79	0.5 (massimo 6 applicazioni ogni 7-10 giorni)	1000	21

PREPARAZIONE DELLA MISCELA e MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Riempire a metà il serbatoio con acqua pulita iniziando l'agitazione. Porre la quantità di prodotto raccomandata nel serbatoio e aggiungere altra acqua fino al volume desiderato, mantenendo in agitazione la miscela.

Impiegare un volume di acqua che consenta la bagnatura uniforme della vegetazione.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Compatibilità

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

RINGO MASSÓ

Fungicida in formulazione granuli idrodispersibili
per il trattamento preventivo di ticchiolatura su melo e pero
Meccanismo d'azione: FRAC M09

Composizione – 100 g di prodotto contengono:
Dithianon puro g 70
Coformulanti q.b. a 100 g



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302. Nocivo per ingestione. H317. Può provocare una reazione allergica cutanea. H319. Provoca grave irritazione oculare. H332. Nocivo se inalato. H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH066. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH210. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102. Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261. Evitare di respirare la polvere. P270. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'uso. P280. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312. In caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni/un medico. P333+P313. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P13. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391. Raccogliere la fuoriuscita. P501. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Sharda Cropchem España, S.L.

Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3, 12th floor - 30006 Murcia, Spagna
Tel +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18771 del 21/10/2024

Distribuito da:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Succursale Italia: Viale Marelli, 132, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia
Tel: +39 02 0996 6107

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

Solfotecnica Italiana SpA, via G. Matteotti 16, 48121 Ravenna (Italia); **Hebei Xingbai Agricultural Technology Co Ltd**, Nanbaishe Bio Industrial Park, Zhao County, Hebei Province, Cina

Taglie: g 100

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Applicazioni precoci: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 30 m da corpi idrici superficiali oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 75% oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 90%.

Applicazioni tardive: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 15 m da corpi idrici superficiali oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 50%.

L'operatore deve indossare indumenti protettivi (braccia, corpo e gambe coperte) e guanti durante le fasi di carico/miscelazione e applicazione durante le applicazioni con trattore, e senza guanti per le applicazioni manuali. Rientrare nell'area trattata dopo che siano trascorsi 10 giorni con indumenti protettivi e guanti o 17 giorni senza guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE