

Ethrel®

Fitoregolatore stimolante i processi di colorazione e di maturazione di pomodoro, tabacco e melo. Su melo regola lo sviluppo vegetativo e l'alternanza di produzione. Assorbito dalla vegetazione, libera etilene accelerando e rendendo più omogenea la colorazione e la maturazione di pomodoro, tabacco e melo. Il suo impiego rende possibile la raccolta meccanica, consente di programmare le raccolte e ne riduce il numero. Razionalizza tutte le operazioni di lavorazione e di stoccaggio successive alla raccolta. Su melo regola lo sviluppo vegetativo e migliora la produzione sotto l'aspetto quali-quantitativo.

Consigli per il corretto impiego

Nebulizzare finemente l'irrorato utilizzando preferibilmente ugelli a cono. Le basse temperature (<12°C) riducono l'efficacia del trattamento. Su varietà ibride di pomodoro da industria, con temperature elevate, utilizzare il dosaggio inferiore, eventualmente frazionando gli interventi.

*Avvertenze (Melo): Una risposta più o meno efficace del prodotto è legata alle condizioni ambientali, allo stadio vegetativo e allo stato fisiologico della pianta. *Ethrel* accelera il processo di maturazione: l'impiego sui frutti può influire negativamente sulla durata del periodo di conservabilità. Non impiegare più di 1,6 L/ha di *Ethrel* per ogni ciclo vegetativo. È consigliabile utilizzare *Ethrel* solo dopo aver effettuato saggi varietali preliminari o su consiglio degli Organi Ufficiali preposti.



Colture	Dose ml/100 litri	Note	Tempo di carenza gg
Pomodoro da industria	1-4 L/ha	Per anticipare e uniformare la produzione. Trattamenti singoli o frazionati Intervenire in presenza del 40-60 % di bacche mature	7
Pomodoro da mensa	200-250	Per anticipare e uniformare la produzione Intervento su frutti invaiati	
Melo*	40-50	Per favorire la colorazione dei frutti su cultivar precoci, 14 giorni prima della prevista raccolta	14
	80-100	Per favorire la colorazione dei frutti su cultivar medio tardive, 15-20 giorni prima delle previste raccolte Importante: associare sempre a un formulato anticascola	
	50-70	Dopo la raccolta dei frutti per rallentare la vegetazione della pianta e accelerare la lignificazione, favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste	
	20-50	Per diradamento, da solo o in miscela con diradanti in fioritura	
	20-50	In fase di accrescimento, applicazioni ripetute inducono un effetto di riduzione della vegetazione e un aumento delle gemme a fiore	
Tabacco	200 350	Per uniformare la colorazione delle foglie 1 L/ha trattamenti su settori di pianta 2 L/ha trattamenti su pianta intera Trattare foglie già fisiologicamente mature (colore verde pisello)	-

Composizione	Etefon 39,6% (= 480 g/L)
Formulazione	Concentrato solubile
Classificazione	Tossicologica: Xn; Ambientale: -
Registrazione Min. San.	n. 6437 del 13.06.1985

®= Marchio registrato

Confezione

Imballo

12 x 1 litro



Bayer CropScience