



Cuprossil-Idro 25 WP

FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO
IN POLVERE BAGNABILE

CARATTERISTICHE

CUPROSSIL-IDRO 25 WP è un fungicida a base di rame idrossido ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche presentano una dimensione estremamente ridotta, che consente loro di ricoprire in modo completo ed uniforme le superfici trattate. Rispetto ai comuni preparati rameici, **CUPROSSIL-IDRO 25 WP** presenta un'elevata capacità di liberare ioni CU++, responsabili dell'azione fungitossica. Queste caratteristiche consentono di ottenere elevati livelli di protezione delle colture con dosaggi di rame metallo inferiori ai preparati tradizionali. **CUPROSSIL-IDRO 25 WP** è efficace anche contro le batteriosi.



COMPOSIZIONE

RAME METALLO (sottoforma di Idrossido*) * sostanza attiva originale SPIESS URANIA CHEMICALS GMBH

g 25

REGISTRAZIONE

n. 9311 del 01/09/1997

CLASSIFICAZIONE

Xi (irritante)

N (pericoloso per l'ambiente)

AVVERTENZE

Il prodotto non è miscibile con gli agrofarmaci a reazione alcalina e con il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari e integratori fisionutrizionali contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile

CONFEZIONE

kg 1 (Cartone: 10x1) - kg 10 - kg 25

CARENZA

3 giorni: prima della raccolta di Fragola, Pomodoro, Cipolla, Melanzana, Cetriolo, Zucchini. **14 giorni:** prima della raccolta della Carota. **20 giorni:** prima della raccolta di Vite, Kiwi, Agrumi, Olivo, Nocciolo, Noce, Patata, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Oleaginose. Sospendere gli interventi ad inizio fioritura per Pomacee, Nespolo. Solo trattamenti invernali per Drupacee.

COLTURE	PATOGENI	DOSI	NOTE
VITE	Peronospora	300-400 g/hl	Attività collaterale su "Black-rot" e Escoriosi.
KIWI	Fitoftora	600 g/hl	Distribuire 10-15 litri alla base della pianta
MELO, PERO, NESPOLO	Cancri rameali Ticchiolatura "Colpo di fuoco" Fitoftora	400-500 g/hl 300 g/hl 400 g/hl 500 g/hl	Caduta foglie e rigonfiamento gemme Pre-fioritura Rigonfiamento gemme / punte verdi Distribuire 15 l/pianta
DRUPACEE	Batteriosi, Bolla, Corineo Cancri rameali	400-500 g/hl	A caduta foglie e a gemma ferma
AGRUMI	Mal secco, Antracnosi Allupatura, Fumaggine Fitoftora	300-400 g/hl 600 g/hl	Distribuire 10-15 l/pianta
OLIVO	Occhio di pavone, Lebbra Rogna, Fumaggini	300-400 g/hl	
NOCCIOLA, NOCE	Antracnosi, Batteriosi	400 g/hl	
FRAGOLA	Vaiolatura, Batteriosi	2,0-2,5 Kg/Ha	
PATATA POMODORO	Peronospora, Alternaria Septoria, Batteriosi	300-400 g/hl	
ORTAGGI (Carota, Cipolla, Melanzana, Cetriolo, Zucchini, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro)	Peronospora, Alternaria Septoria, Cladosporiosi, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi	200-300 g/hl	
OLEAGINOSE	Peronospora, Alternaria	1,5-2,0 Kg/Ha	
RISO	Alghe verdi	4,0-5,0 Kg/Ha	
COLTURE FLOREALI	Peronospora, Alternaria,	200-300 g/hl	
ORNAMENTALI E FORESTALI	Antracnosi, Septoria, Ruggine, Ticchiolatura		