

FUNGICIDI

Sponsor®

Fungicida triazolico sistemico per la lotta contro numerose malattie che attaccano le colture frutticole, orticole e floricole

**Composizione**

Difenconazolo (250 g/l) 23,23%

Formulazione Concentrato emulsionabile

Confezioni 0,5

Registrazione n° 13926 del 13.09.2007

Tempo di carenza: Barbabietola da zucchero, Sedano e Vite 21 gg.; Melo, Pero, Patata e Cavolfiore 14 gg.; Finocchio 3 gg.; altre colture 7 gg.

Caratteristiche

Sponsor® è un fungicida sistemico dotato di lunga persistenza e spiccata attività preventiva, curativa ed eradicante. Similmente agli altri triazoli, Sponsor® agisce sulla sintesi dell'ergosterolo, inibendo la crescita subcuticolare del micelio e di conseguenza la sporulazione. Molto interessante è risultata la spiccata attività di contenimento della bolla del pesco, nell'annata successiva a quella dove sono stati effettuati trattamenti con Sponsor® contro la Monilia dei frutti in pre-raccolta.

Indicazioni di rischio**Modalità d'impiego**

Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Note
Pesco	Bolla	20-30	Eseguire 2-3 trattamenti da rottura gemme. Il prodotto possiede una eccellente attività anche contro la monilia dei fiori.
	Monilia dei frutti	20-30	1-2 trattamenti in pre-raccolta.
Melo, Pero	Ticchiolatura, Oidio	15	Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 gg. o curativi entro 96-100 ore dalla pioggia infettante. Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.
Vite	Black-rot, Oidio	15-20	3-4 trattamenti preventivi ogni 10-14 giorni.
Asparago	<i>Puccinia asparagi</i> , <i>Stemphylium vesicarium</i>	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ogni 10-14 giorni.
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , Ruggini, Oidio, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi ogni 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia.
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di circa 10 giorni.
	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , Ruggini, Oidio, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi ogni 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia.
Cetriolo	Oidio, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi ogni 10-14 giorni.
Finocchio	Ramularia	0,5 l/ha	Massimo 3 trattamenti preventivi ogni 8 giorni.
Barbabietola da zucchero	Cercospora	0,2-0,3 l/ha	Massimo 3 trattamenti ogni 15-20 giorni.
Rosa, Garofano	Oidio, Ticchiolatura, Ruggini	100	2-3 trattamenti preventivi ogni 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.

Vantaggi

Attività elevata e costante. Azione preventiva, curativa e bloccante. Breve periodo di sicurezza. Registrato anche su Finocchio.

Avvertenze

T trattare nelle ore più fresche della giornata.

Sponsor®: marchio registrato Gowan Italia. Prodotto originale Syngenta Crop Protection.