

# Muligan



> Insetticida specifico per il controllo delle cocciniglie e della mosca bianca delle principali colture arboree ed erbacee



Composizione	pyriproxyfen..... 10,86% (100 g/l)
Formulazione	concentrato emulsionabile (EC)
Peso specifico	920 g/l
Registrazione Min. Salute	n° 15948 del 11.12.2013
Indicazioni di pericolo	Nocivo (Xn), Pericoloso per l'ambiente (N)
Intervallo di sicurezza	30 gg Agrumi 21 gg Pesco, Nettarine, Susino 3 gg Pomodoro, Melanzana
Prescrizioni supplementari	Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di 25 m per gli Agrumi, di 15 m per Pomacee e Drupacee e di 10 m per Olivo, Vite, Floreali ed Ornamentali.



## SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	INSETTO	DOSE (ml/ha)	NOTE
Vite	Cocciniglie	50-75 (0,25-0,75 l/ha)	Trattare prima della fioritura
Olivo	Cocciniglie	25-30 (0,175-0,375 l/ha)	Trattare un mese prima della fioritura
Melo, Pero	Cocciniglia di San José	37,5-50 (0,3-0,5 l/ha)	Intervenire a fine inverno sulle neanidi svernanti
Pesco, Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino	Cocciniglia di San José, Cocciniglia bianca del pesco	37,5-50 (0,3-0,5 l/ha)	Su Ciliegio e Albicocco trattare solo in pre-fioritura
Agrumi	Cocciniglie	50-75 (1-1,5 l/ha)	Intervenire alla comparsa delle prime forme larvali
Pomodoro, Melanzana (in serra)	Mosche bianche	50-75 (0,25-0,95 l/ha)	Intervenire alla prima comparsa degli adulti
Ornamentali e Floreali (in serra e in pieno campo)	Mosche bianche	50-75 (0,25-0,75 l/ha)	Intervenire alla prima comparsa degli adulti
	Cocciniglie	50-75 (0,25-0,75 l/ha)	Intervenire alla comparsa delle prime forme larvali



**FLACONE 1 litro** (cartone 12 pz)

## AVVERTENZE

Per gli interventi su Agrumi, Pomacee, Drupacee, Olivo, Vite, Ornamentali e floreali (in pieno campo) effettuare un trattamento all'anno. Per Pomodoro, Melanzana, Ornamentali e Floreali (in serra) effettuare eventualmente un secondo trattamento a distanza di 10 gg.