

# SPOTLIGHT PLUS

## DISERBANTE PER LA SPOLLONATURA/DISERBO E DISSECCAMENTO DELLA PATATA

<b>Composizione</b>	Carfentrazone-Etile* g 6,45 (60 g/l)
<b>Formulazione</b>	Emulsione Acqua/Olio
<b>Classificazione</b>	Irritante (Xi)
<b>Registrazione</b>	N. 13466 del 25/02/2010
<b>Confezione</b>	0,5 L - 1 L - 5 L

**SPOTLIGHT PLUS** è un erbicida di post-emergenza utilizzato su melo, pero, pesco, actinidia, olivo, agrumi, vite, vivai di piante arbustive ed arboree e sulle aree non coltivate, per il controllo di numerose infestanti normalmente presenti al momento del trattamento. Il prodotto è assorbito per via fogliare e agisce per contatto bloccando la crescita delle infestanti sensibili con sintomi che si manifestano entro pochi giorni dal trattamento (necrosi e successiva morte). Il prodotto impiegato come diserbante integra o rende più rapida l'azione di erbicidi totali, sistemici o di contatto (*Glifosate*) nei confronti di infestanti quali Vilucchio (*Convolvulus arvensis*), Malva (*Malva sylvestris*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Acetosella (*Oxalis spp.*), Piantaggine (*Plantago maior*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Ortica (*Urtica dioica*). **SPOTLIGHT PLUS** possiede un forte attività disseccante della Patata in pre-raccolta e un'eccellente azione spollonante per Actinidia, Nocciolo, Vite, Olivo, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

\* Sostanza attiva originale FMC Crop

## Trattamento per coltura

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	NOTE	DOSE	TEMPO di CARENZA
VITE, MELO, PERO, KIWI, PESCO, SUSINO, AGRUMI, NOCCIOLO	<i>Vilucchio (Convolvulus arvensis), Malva (Malva sylvestris), Porcellana (Portulaca oleracea), Acetosella (Oxalis spp.), Piantaggine (Plantago maior), Erba morella (Solanum nigrum), Ortica (Urtica dioica).</i>	intervenire, in miscela con erbicidi sistemici	0,3 l/ha	7 gg
OLIVO				non previsto
<b>DISERBO TOTALE DEGLI INCOLTI</b> (aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie)				
<b>VIVAI DI PIANTE ARBUSTIVE E ARBOREE</b>				
KIWI, OLIVO, PESCO, SUSINO, MELO, PERO, AGRUMI, VITE	<i>Azione spollonante (controllo dei germogli basali e del tronco)</i>	Localizzare il trattamento sulle zone dei polloni utilizzando barre schermate che evitino che la deriva della soluzione raggiunga la vegetazione non interessata al trattamento. Utilizzare basse pressioni d'esercizio (1-2 bar). Per ottenere risultati ottimali trattare i polloni da eliminare quando presentano una lunghezza di 10-15 cm.	0,3 l/ha	7 gg
NOCCIOLO			0,35-0,40 l/ha	
PATATA	<i>Azione dissecante</i>	Applicare il prodotto alla completa maturazione dei tuberi e ad inizio del processo di senescenza della coltura.	1 l/ha	3 gg

### AVVERTENZE AGRONOMICHE

Spotlight Plus agisce per contatto. La qualità dell'attività di disseccamento dipende dalla accuratezza con la quale viene realizzata l'applicazione del prodotto. Eseguire una adeguata ed uniforme distribuzione della poltiglia, assicurandosi che la velocità di avanzamento del trattore e la pressione della pompa permettano una elevata penetrazione del prodotto nella vegetazione. Utilizzare esclusivamente ugelli antideriva. Applicare il prodotto preferibilmente al mattino anche in presenza di vegetazione leggermente umida.

Attività dissecante su patata: per ottenere una attività dissecante ottimale evitare l'applicazione in condizioni climatiche estreme: siccità od umidità eccessive, temperature elevate ed umidità dell'aria molto bassa. Non applicare il prodotto al calare delle tenebre. Non applicare Spotlight Plus su colture di patata colpite da forti attacchi di peronospora. È consigliabile mantenere l'agitatore dell'irroratrice costantemente in movimento.

