



CONSIGLI DI UTILIZZO

COLTURE	DOSI	CONSIGLI
Fruttiferi	1-3 l/ha	Prima della fioritura, da post fioritura fino a post raccolta
Vite	1-3 l/ha	Prima e dopo la fioritura
Ortaggi	1-3 l/ha	Prima e dopo la fioritura oppure in caso di bisogno in presenza di apparato fogliare sufficiente
Bietola	1-3 l/ha	A partire dallo stadio di 6-8 foglie fino alla chiusura della fila
Olivo	1-3 l/ha	Prima e dopo la fioritura
Girasole	1-3 l/ha	A partire dallo stadio di 4-5 foglie
Colza	1-3 l/ha	In primavera, all'inizio dell'allungamento fino all'inizio della fioritura

Agitare bene prima dell'uso. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 30°C. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell'ambiente.

Peso netto: 1 kg (equivalente a 0,694 litri)

**INNOVAZIONE
EFFICIENTE**

Naturale & sicuro ✓

Alto grado
di assorbimento

Assenza di
Frasì di Rischio

Assenza di
rugginosità su
Golden Delicious

Non contiene
amminocoli e
composti
quaternari di ammonio



Rheobor FL

COMPOSIZIONE

CONCIME CE

Concime borato in sospensione (calcio)

Boro (B) totale 7 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: borato di calcio



FABBRICANTE: S.A. ROSIER
Rue de Grandmetz, 1A
7911 Moustier Ht - BELGIO
www.rheobor.com

La nuova generazione di Boro

