



MERPAN® 80 WDG

FUNGICIDA ORGANICO PER LA DIFESA DI POMACEE E DRUPACE



COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomacee	Ticchiolatura, Maculatura bruna del pero, Marciume bruno, Marciume lenticellare	150-160 g/hL	Non superare i 10 trattamenti l'anno	21 giorni
Pesco, nettarine	Bolla, Monilia, Corineo, Fusicocco	300 g/hL	Applicazioni al bruno da caduta foglie a rottura gemme	-
		150 g/hL	Dalla ripresa vegetativa fino a fine fioritura/caduta petali	
Albicocco	Monilia, Corineo, Fusicocco	300 g/hL	Applicazioni al bruno da caduta foglie a rottura gemme	10 giorni
		150 g/hL	Alla ripresa vegetativa e in vegetazione	
Mais	Moria ed avvizzimento dei germinelli, Marciumi delle piantine (Pythium, Diplodia, ecc.)	60-75 g/100 kg di seme	Applicazioni come conciante delle sementi. Stemperare il prodotto in una quantità di acqua pari a 1,5 litri/100 kg di seme. La miscela ottenuta può essere mescolata direttamente alla semente da conciare o spruzzata tramite apposita apparecchiatura	-
Sorgo		130-170 g/100 kg di seme		
Cavolo e cavolfiore	Marciumi	75-90 g/100 kg di seme		
Melone, cocomero	Pythium spp., Phytophthora	90-135 g/100 kg di seme	Applicazioni come conciante delle sementi. Stemperare il prodotto in una quantità di acqua pari a 1,5 litri/100 kg di seme. La miscela ottenuta può essere mescolata direttamente alla semente da conciare o spruzzata tramite apposita apparecchiatura	-
Spinacio		170-250 g/100 kg di seme		
Fagiolo, pisello		70-110 g/100 kg di seme		
Altre orticole		60-170 g/100 kg di seme		

CONFEZIONE

Busta da 1 kg (10x1)



Sacco da 5 kg (4x5)



Fungicidi



COMPOSIZIONE

Captano puro 80% (800g/Kg)

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

INDICAZIONI DI PERICOLO



Xn - Nocivo



N - Pericoloso per l'ambiente

N. REGISTRAZIONE

Reg. n. 8102 del 9-11-1992