

**BRAI** è un insetticida regolatore di crescita attivo per contatto e ingestione. Il prodotto agisce sullo sviluppo dell'insetto, inibendo i naturali processi evolutivi come la metamorfosi, l'embriogenesi e la riproduzione, causando così l'eliminazione del parassita. Il prodotto ha un'elevata persistenza e pertanto assicura un controllo duraturo degli insetti.

**Composizione:**

Pyriproxyfen puro 10,8% (100 g/L)

**N° di registrazione:**

16404 del 18.02.2016

**Indicazioni di pericolo:**

PERICOLO  
H304 – H315 – H317 – H318 – H410  
EUH401

**Formulazione:**

Concentrato emulsionabile

**Confezione:**

L 1



**Intervallo di sicurezza:** 3 giorni per pomodoro; 30 giorni per agrumi.

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE
Agrumi	Cocciniglia rossa degli agrumi ( <i>Aonidiella aurantii</i> ), Cocciniglia grigia degli agrumi ( <i>Parlatoria pergandei</i> ), Cocciniglia bianca del limone ( <i>Aspidiotus neri</i> ), Cocciniglia elmetto degli agrumi ( <i>Ceroplastes sinensis</i> ), Cocciniglia serpetta ( <i>Lepidosaphes gloverii</i> ) e cocciniglia virgola ( <i>Lepidosaphes beckii</i> )	40 - 50 mL/hL	Volumi d'acqua di 1000-2250 L/ha (dosaggio max di p.f. 1,125 L/ha). Intervenire tra maggio e giugno o tra agosto e settembre, alla comparsa delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. Effettuare un solo trattamento per anno.
Pomacee	Cocciniglia di San José ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )	40 - 50 mL/hL	Trattamento in pre-fioritura con volumi d'acqua di 700-1000 L/ha (max. 0,5 L/ha di p.f.). Effettuare un solo trattamento per anno.
Drupacee	Cocciniglia di San José ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )	40 - 50 mL/hL	Trattamento in pre-fioritura con volumi d'acqua di 700-1000 L/ha (max. 0,5 L/ha di p.f.). Effettuare un solo trattamento per anno.
Pomodoro (in serra)	Mosche bianche ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	50 - 75 mL/hL	Volumi d'acqua di 1000-1500 L/ha (max. 1,125 l/ha di p.f.). Intervenire alla comparsa degli adulti, effettuando massimo due trattamenti per anno con un intervallo tra le applicazioni di 10 giorni.



Le informazioni inserite sono aggiornate al dicembre 2016. Gli agrofarmaci descritti nel presente catalogo sono autorizzati dal Ministero della Salute. Per il corretto impiego dei prodotti si raccomanda di seguire quanto riportato sulle etichette delle confezioni. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza evidenziati in etichetta.