

**ERBICIDA NON SELETTIVO AD AZIONE DISSECCANTE**

REGLONE W agisce per contatto, disseccando rapidamente le parti verdi delle infestanti interessate dal trattamento.

Poco sensibile alle condizioni ambientali e non influenzato dalla temperatura, può essere utilizzato sia su terreno bagnato sia dopo periodi di prolungata siccità.

**ERBICIDA**

**COMPOSIZIONE**

Diquat 17%  
(200 g/l)

**FORMULAZIONE**

liquido solubile

**INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)**
**PERICOLO**
**NUMERO DI REGISTRAZIONE**

0630 del 23.3.76


**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**

CAMPI DI IMPIEGO	COLTURE	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Diserbo	Vite, agrumi, fruttiferi e altre colture arboree Spollonatura del vigneto	3,3 - 5	Intervenire con infestanti non molto sviluppate, impiegando basse pressioni di esercizio ed ugelli a ventaglio o a specchio.	Sospendere i trattamenti 10 gg prima della raccolta delle patate 15 gg prima della raccolta per i trattamenti interfilari delle orticole 30 gg prima della raccolta delle altre colture
	Preparazione letti di semina o di trapianto Vivai Asparagiaie Lotta contro la cuscuta Diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali	2 - 4		
	Erba medica (escluso anno d'impianto)	2,5 - 3,3		
	Mais e semina senza aratura (sod-seeding)	3,3 - 5		
Disseccamenti colture da seme	Erba medica Mais Grano	1,6 - 3,3		
	Disseccamenti	Piante da fibra		
	Culmi patate	3,3 - 5		

Nelle applicazioni di diserbo si raccomanda di impiegare REGLONE W con un opportuno bagnante non ionico

**ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:**

Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla, può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree.

**CONFEZIONI**


flaconi da **1 l**  
in cartoni da 12 pezzi

taniche da **5 l**  
in cartoni da 4 pezzi

