



BERLINA

INSETTICIDA-ACARICIDA A BASE DI ABAMECTINA
SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI ACARI, PSILLE E TRIPIDI
IN EMULSIONE CONCENTRATA

- Specifico contro tutti gli stadi mobili di insetti e acari, con particolare attività sulle Psille
- Inibisce la mobilità dei parassiti trattati, che cessano di alimentarsi, riducendo al minimo il danno arrecato alla coltura.
- La morte sopravviene di norma dopo 3-5 giorni dall'applicazione.



Applicazione
sulla pianta



COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

ABAMECTINA g 1,9 (= 18 g/l)
(*Prodotto originale Rotam LTD)



REGISTRAZIONE

n. 13307 del 28/04/2009



CLASSIFICAZIONE

CLP H302, H319, H332, H335, H373, H410



FORMULAZIONE

Emulsione concentrata



CONFEZIONI

1 litro (Cartone: 10x1) - 5 litri (Cartone: 4x5)



CARENZA

3 giorni: Melone, Cetriolo, Peperone - **7 giorni:** Pomodoro, Melanzana, Fragola - **10 giorni:** Arancio, Madarino, Limone
14 giorni: Pero, Lattuga - **28 Giorni:** Melo, Vite



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Il prodotto non è compatibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina (Poliolfufuri, poltiglie bordolesi alcaline...).



COLTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

PERO, MELO	Psille	75 ml/hl (0,75-1,5 l/Ha)	Alla comparsa delle prime neanidi (in particolare della seconda generazione)
	Ragnetti rossi, Eriofidi, Cemiostoma, Litocollette	75 ml/hl (0,75-1,5 l/Ha)	Intervenire due settimane dalla caduta petali
ARANCIO, MANDARINO, LIMONE	Minatrice serpentina	37,5 ml/hl (0,375-0,750 l/Ha)	Alla comparsa delle prime mine sui nuovi getti
	Ragnetti rossi	75 ml/hl (0,750 l/Ha)	Intervenire a inizio infestazione
VITE	Ragnetti rossi, Ragnetto giallo	75 ml/hl (0,750 l/Ha)	Intervenire a inizio infestazione
	Tignola, Tignoletta	50-75 ml/hl (0,50-0,75 l/Ha)	Intervenire a inizio ovideposizione
POMODORO, PEPPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, MELONE	Ragnetti rossi, Eriofidi	60 ml/hl (0,3-1,2 l/Ha)	Intervenire a inizio infestazione
	Minatrici fogliari	60 ml/hl (0,3-1,2 l/Ha)	Due interventi alle prime punture di ovideposizione
	Tripidi	75 ml/hl (0,75-1,20 l/hl)	
FRAGOLA	Ragnetti rossi	40 ml/hl (0,5 l/Ha)	Intervenire a inizio infestazione
	Tripidi	75 ml/hl (0,75-1,20 l/hl)	In caso di presenza delle forme mobili aumentare la dose a 100 ml/hl
LATTUGA	Minatori fogliari	60 ml/hl (0,3-1,2 l/Ha)	Interventi ogni 7-10 gg
FLOREALI E ORNAMENTALI (IN TERRA E/O VASO)	Ragnetto rosso Minatrici fogliari Tripidi	25-50 ml/hl (0,5-1,5 l/Ha) 0,5 l/hl (0,5-1,5 l/Ha) 75 ml/hl (0,5-1,5 l/Ha)	Intervenire a inizio infestazione