



Avvertenza: **ATTENZIONE**  
Indicazioni di pericolo:  
**H410 - EUH401**

<b>FORMULAZIONE:</b> Emulsione acquosa	<b>COMPOSIZIONE:</b> Tau-fluvalinate puro 21,4% (240 g/l)	<b>IRAC:</b> 3A	<b>N. REGISTRAZIONE:</b> 9800 del 02-11-1998
---	--	--------------------	---

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Melo, Pero, Melo cotogno, Nespolo	Afidi, Ditteri cecidomidi, Lepidotteri, forme mobili giovanili di Cocciniglia, Psille e Cimice asiatica	0,6 l/ha (40-120 ml/hl)		30 giorni
Pesco, Albicocco, Nettarino	Lepidotteri, Tripidi, Mosca della frutta	0,6 l/ha (40-120 ml/hl)		30 giorni
Vite da vino e da tavola	Cicaline, Tripidi	0,3 l/ha (30-300 ml/hl)		21 giorni
Melanzana	Afidi, Tripidi, Lepidotteri	0,2 l/ha		3 giorni
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini	Afidi, Tripidi	0,2 l/ha		7 giorni
Melone	Afidi, Tripidi	0,3 l/ha		7 giorni
Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Lenticchia, Cece, Cicerchia (da consumo fresco senza baccello ed essiccati)	Afidi, Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi	0,3 l/ha		7 giorni (consumo fresco), 14 giorni (consumo secco)
Carota e Bietola rossa	Afidi	0,3 l/ha	Massimo 2 trattamenti/anno con intervallo di 14 giorni tra le applicazioni. È consentito l'impiego in colture in pieno campo	14 giorni
Lattuga, Lattughino, Indivia, Scarola, Bietolino	Afidi, Tripidi, Miridi, Lepidotteri, Minatori fogliari	0,4 l/ha		14 giorni
Fragola	Afidi, Tripidi, Lepidotteri	0,3 l/ha		7 giorni
Patata	Afidi, Dorifora	0,3 l/ha		14 giorni
Frumento, Orzo, Avena, Segale, Triticale	Afidi, Ditteri cecidomidi, Cimici, Cicaline	0,2 l/ha		30 giorni
Barbabietola da zucchero	Afidi, Lepidotteri, Altica, Cleono, Cassida	0,2 l/ha		14 giorni
Colza	Afidi, Coleotteri	0,2 l/ha		30 giorni
Erba medica	Afidi, Coleotteri, Tripidi e Lepidotteri	0,3 l/ha		7 giorni
Colture Floreali e Ornamentali, Forestali e Vivai	Afidi, larve di Cocciniglia, Tripidi, Lepidotteri, Cicaline, Coleotteri e Acari	0,4 l/ha (40-80 ml/hl)		-
Carciofo, Cardo	Afidi, Lepidotteri	0,3 l/ha		7 giorni
Cavolfiore, Cavolo cappuccio, Cavoleto di Bruxelles	Afidi, Tripidi, Lepidotteri	0,3 l/ha	Massimo 1 trattamento/anno	7 giorni



#### MISURE DI MITIGAZIONE

**Per proteggere gli organismi acquatici:**

fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- 20 m + trattamento ultima fila dall'esterno verso l'interno + presenza siepe sempreverde per Pomacee, Drupacee e Ornamentali
- 10 m + ugelli fine barra 01-03 per Lattuga
- 10 m + trattamento ultima fila dall'esterno verso l'interno + presenza siepe sempreverde per Vite
- 5 m + ugelli fine barra 01-03 per tutte le altre colture erbacee

**Per proteggere gli artropodi non bersaglio:**

fascia di sicurezza non trattata a bordo campo di:

- 20 m per Pomacee e Drupacee
- 5 m per Vite, Ornamentali e Legumi

