

Pyrus 400 SC

PYRUS 400 SC è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC, appartenente alla famiglia chimica delle Anilinopirimidine. **PYRUS 400 SC** esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione.

Fungicidi

Composizione:

Pyrimethanil puro 37,4% (400 g/L)

Formulazione:

Sospensione concentrata (SC)

N° di registrazione:

13998 del 18.10.2011

Indicazioni di pericolo:

H411 - EUH401

Confezione:

L 1

Intervallo di sicurezza:

3 gg per fragola; 21 gg per vite; 56 gg per melo e pero.



Colture	Avversità	Dose	Note
Vite	Botrite	200 - 250 mL/hL	Massimo 2 trattamenti nelle fasi: fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura e 3 settimane prima della raccolta.
Melo e Pero	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	1 L/ha	Massimo 3 trattamenti per stagione ogni 7 giorni a partire da orecchiette di topo fino a fine fioritura.
Fragola	Botrite	150 - 200 mL/hL	Massimo due applicazioni per stagione ogni 10 - 14 giorni.