

Delan® Pro

Unico come la tua arte

| | |
|--|--|
| Nome prodotto | DELAN® PRO |
| Composizione | 125 g/l Dithianon + 561 g/l Fosfonato di Potassio (corrispondente a 375 g/L di acido fosfonico equivalente) |
| Formulazione | Sospensione Concentrata (SC) |
| Registrazione | N° 16562 del 14-01-2016 Estensione su vite del 29/03/2017 |
| Colture in etichetta* | Vite da vino |
| Patogeni controllati | Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>) Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>) Black Rot (<i>Guignardia bidwellii</i>) |
| Dosaggi di applicazione: Escoriosi Peronospora e Black Rot | 3 l/ha 3-4 l/ha |
| Numero e intervallo tra le applicazioni: Escoriosi Peronospora e Black Rot | 2 trattamenti a 7 giorni 4 trattamenti a 10-14 giorni |
| Finestra di applicazione | Da germogliamento a 42 giorni prima della raccolta |
| Intervallo di sicurezza | 42 giorni |
| Classificazione | ATTENZIONE  |
| Confezioni | Taniche da 5 e 10 litri |

*altre colture in etichetta: Melo e Pero



BASF Italia S.p.A. | Agricultural Solutions

Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 512 1 - Fax 0362 512 065

Per maggiori informazioni
www.agro.basf.it | info.agroitalia@basf.com

 **BASF**
We create chemistry

AGENCE DUFRESNE CORRIGAN SCARLETT - October 2015. Photos credits : Thinkstock, BASF.

AGROFARMACO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE A BASE DI DITHIANON E FOSFONATO DI POTASSIO, N. REGISTRAZIONE 16562. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI ED I SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATE IN ESSA.

Delan® Pro: una combinazione unica per la massima affidabilità

Delan® Pro è una combinazione unica di **Dithianon** e **Fosfonato di Potassio**, che offre al viticoltore un'ampia gamma di benefici

Delan® Pro è una soluzione **semplice ed efficiente** per il controllo della Peronospora della vite in grado di garantire **un'elevata affidabilità di risultato anche nelle condizioni più difficili** (forte piovosità ed elevata pressione) **sia su foglie che su grappoli**

Delan® Pro possiede **un'azione sistemica** in grado di **proteggere la nuova vegetazione** formata dopo il trattamento per una maggiore persistenza di azione

Delan® Pro possiede **un'attività multisito** che **impedisce lo sviluppo di ceppi resistenti** ed è quindi un ottimo strumento per la **costruzione di programmi di protezione sicuri ed affidabili negli anni**

Delan® Pro è dotato di un **ampio spettro d'azione** che include anche Escoriosi e Black Rot, per una **protezione completa del vigneto**

Delan® Pro è di **facile utilizzo** ed è compatibile con un'ampia gamma di agrofarmaci della vite



Posizionamento di Delan® Pro nel programma di protezione della vite

Delan® Pro: finestra di applicazione



Germogliamento Foglie distese Differenziazione grappoli Inizio fioritura Fioritura Allegagione Ingrossamento acini Chiusura grappolo Invaiaitura Maturazione

Escoriosi

Peronospora e Black Rot

Delan® Pro

Delan® Pro

Delan® Pro presenta un'ampia finestra di applicazione:

- **Escoriosi**: da germogliamento 3 l/ha a 7 giorni; max 2 applicazioni;
- **Peronospora e Black Rot**: da foglie distese 3-4 l/ha ogni 10-14 giorni; max 4 applicazioni
Utilizzare l'intervallo più breve in caso di forte pressione o elevato accrescimento fogliare; La dose di 3 - 3.5 Lt/ha si è dimostrata adeguata ed affidabile nella maggior parte delle situazioni. Si consiglia di applicare Delan® Pro in modo preventivo.

Raccomandazioni tecniche ulteriori: non trattare in allegagione/acino pepe (BBCH 71 - 73) su varietà sensibili.

Delan® Pro: Inserimento nella strategia BASF



Germogliamento Foglie distese Differenziazione grappoli Inizio fioritura Fioritura Allegagione Ingrossamento acini Chiusura grappolo Invaiaitura Maturazione

Polyram

Kauritil® Ultra WG

Forum® Top / Gold / Star

Forum® R3B

Saviran® MZ / Star

NOVITA

Delan® Pro

Delan® Pro

Enervin®

Delan® Pro si inserisce nella strategia antiperonosporica BASF in due momenti del ciclo vegetativo in funzione della pressione di Peronospora:

- per i trattamenti di **pre-fioritura / fioritura** nella maggior parte delle situazioni;
- anche nella fase da **acino pisello** in poi nelle zone o annate a maggior pressione di malattia.