

INSETTICIDI

POLITHIOL®



POLITHIOL® è un olio minerale paraffinico per impiego al bruno, formulato in modo innovativo (suspo-emulsione) con coadiuvanti specifici e contenente zolfo. POLITHIOL® è il prodotto ideale per controllare nuovi e vecchi parassiti (Eriofidi, Cocciniglie, Psilla, etc.) ed un aiuto indispensabile per impostare linee di difesa fin dall'inizio della stagione. Di notevole interesse sono anche gli effetti collaterali nei confronti di numerosi patogeni fungini (Oidio, Bolla, Monilia, etc.), attraverso la riduzione del loro potenziale di inoculo.



Composizione Olio minerale paraffinico 41,3% (= 400 g/L)
Formulazione Suspoemulsione
Tempo di sicurezza Non previsto

Indice di rischio Xi - irritante
Class. ambientale Non classificato
N° di registrazione 11760 del 01.03.2006
Confezione L 20 - 200 - 1.000



Colture	Avversità	Dosi L/hL	Note
 DRUPACEE (albicocco, ciliegio, pesco, susino, mandorlo)	Cicaline, Acari, Eriofidi, Metcalfa, Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Uova di Lepidotteri, Oidio*, Bolla*, Monilia*	5 - 6	Trattamento durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")
 POMACEE (melo, pero, cotogno)	Cocciniglie, Cicaline, Eriofidi, Acari, Metcalfa, Afidi, Psilla, Tignole, Uova di Lepidotteri, Oidio*	5 - 6	Trattamento durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")
 CACO, FICO, RIBES, NOCE, NOCCIOLO	Cocciniglie, Cicaline, Cimici, Eriofidi, Psilla, Metcalfa, Afidi, Uova di Lepidotteri, Acari	5 - 6	Trattamento durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")
 VITE (uva da vino e da tavola)	Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Uova di Lepidotteri, Cicaline, Tignole, Metcalfa, Acari, Oidio*	5 - 6	Trattamento durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma cotonosa")
 ACTINIDIA	Cocciniglia bianca	5	Trattamento durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma cotonosa")

**PER MASSIMIZZARE L'EFFICACIA
IMPIEGARE SEMPRE VOLUMI
DI IRRORAZIONE ADEGUATI
AL FINE DI GARANTIRE UNA
SUFFICIENTE BAGNATURA
DELLE PIANTE TRATTATE**

* Effetto collaterale