

## INSETTICIDA-AFICIDA FOGLIARE SISTEMICO CONCENTRATO SOLUBILE

### CARATTERISTICHE

**CORSARIO** è un insetticida fogliare sistemico a base di Imidacloprid, specifico per il controllo di afidi, aleurodidi e altri insetti delle colture frutticole, orticole e ornamentali. **CORSARIO** è caratterizzato da una elevata sistemicità acropeta.

È assorbito dalle radici, dal fusto e dalle foglie e viene traslocato nella pianta attraverso la corrente xilematica (ascendente) e veicolato alle foglie presenti e a quelle in corso di formazione. Pertanto garantisce protezione anche ai tessuti in via di sviluppo o non ancora formati al momento del trattamento. Il principio attivo viene assorbito anche attraverso la cuticola fogliare (azione citotropica e translaminare) Sui parassiti agisce principalmente per ingestione, provocandone la morte pochi istanti dopo il trattamento.



### COMPOSIZIONE

IMIDACLOPRID (Prodotto originale Sapec Agro S.A.)

g 17,1 (200 g/l)

### REGISTRAZIONE

n. 12519 del 31/07/2009

### CLASSIFICAZIONE

N (pericoloso per l'ambiente)

### AVVERTENZE

Il prodotto contiene una sostanza altamente tossica per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare nei 10 giorni precedenti la fioritura e durante la fioritura. Prima dell'applicazione del prodotto sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura o prossime alla fioritura, possibilmente anche nelle immediate vicinanze della coltura. Trattare l'ultima fila di alberi solo verso l'interno.

### FORMULAZIONE

Concentrato solubile

### CONFEZIONE

1 litro (Cartone: 12x1) - 0,250 litri (Cartone: 20x0,250)

### CARENZA

Sospendere i trattamenti **7 giorni** prima del raccolto per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone; **14 giorni** per agrumi, patata e tabacco; **21 giorni** per pesco e nectarine, susino, ciliegio; **28 giorni** per melo; **35 giorni** per albicocco, **50 giorni** per pero.

COLTURE	PARASSITI	DOSI	NOTE
MELO, PERO	Afidi	50 ml/hl	Trattare nella fase di orecchiette di topo, consigliato in miscela con Albene (2-3%)
	Cicaline, Psilla del melo, Tentredini	50 ml/hl	Applicazioni in post-fioritura (per i microlepidotteri al picco dello sfarfallamento).
PESCO, NETTARINE, SUSINO, CILIEGIO, ALBICOCCO	Afidi	50 ml/hl	Intervenire dalla fase di rottura gemme bottone rosa o in vegetazione, consigliato in miscela con Albene 1,5-2%
	Microlepidotteri, Contro Tentredine del Susino, Metcalfa, Cicaline	50 ml/hl	Intervenire ad inizio infestazione.
ARANCIO, CLEMENTINO, MANDARINO, LIMONE	Afidi	50 ml/hl	Intervenire a inizio dello sviluppo delle prime colonie
	Aleurodidi, Minatrice serpentina	75 ml/hl	
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, COCOMERO, MELONE	Afidi	50 ml/hl	Intervenire a inizio dello sviluppo delle prime colonie
	Aleurodidi, Dorifora	75 ml/hl	In presenza di infestazioni miste (forme giovanili e adulti) si consiglia miscela con piretroidi
PATATA	Afidi	50 ml/hl	Intervenire precocemente per un migliore controllo e prevenire la trasmissione delle virosi
	Dorifora	75 ml/hl	Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni
TABACCO	Afidi, Altica	50 ml/hl	
FLOREALI ED ORNAMENTALI	Afidi, Metcalfa	50 ml/hl	
	Aleurodidi	75 ml/hl	
	Impiego in fertirrigazione	0.5-1 lt/hl di soluzione	Impiegare il quantitativo di acqua normalmente utilizzato