

INSETTICIDA FOSFORGANICO A BASSA TOSSICITÀ IN EMULSIONE CONCENTRATA

CARATTERISTICHE

Insetticida fosfororganico che esplica la propria azione per contatto e per ingestione. Viene assorbito dalle foglie e dalle altre parti verdi della pianta e si diffonde negli strati più superficiali dell'epidermide.

La sua azione è estremamente rapida nei confronti di numerosi fitofagi dotati di apparato boccale masticatore o succhiatore.

IMIDAN® EC presenta un'elevata selettività verso l'acarotomofauna utile e non favorisce la pullulazione degli acari. La nuova formulazione in emulsione concentrata mantiene un favorevole profilo tossicologico.

Si consiglia di acidificare sempre la soluzione con Corrector.



COMPOSIZIONE

FOSMET*

g 17,7 (200 g/l)

(* Sostanza attiva originale GOWAN Co.)

REGISTRAZIONE

n. 12659 del 18/05/2005

CLASSIFICAZIONE

N (pericoloso per l'ambiente)

AVVERTENZE

Il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra. Escludere le miscele con prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poriglie Bordolessi alcaline, ecc.)

FORMULAZIONE

Emulsione concentrata

CONFEZIONE

1 litro (Cartone: 12x1) - 5 litri (Cartone: 4x5)

CARENZA

10 giorni: Ciliegio. - **21 giorni:** Melo, Pero.

28 giorni: Pesco, Albicocco.

30 giorni: Susino, Olivo, Agrumi, Patata.

COLTURE	PARASSITI	DOSI	NOTE
MELO	Carpocapsa, Cidia, Antonomo, Tortricidi, Microlepidotteri minatori, Psilla, Falene, Orgia, Sesia, Rizotrogo, Neanidi di Cocciniglie	250-300 ml/hl	
		300 ml/hl	
PERO	Carpocapsa, Cidia, Tortricidi, Tentredini	250-300 ml/hl	
	Psilla, Neanidi di Cocciniglie	300 ml/hl	
PESCO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO	Cidia, Anarsia, Microlepidotteri minatori, Mosca, Eulia, Orgia, Nottue, Tripidi, Neanidi di Cocciniglie	250-300 ml/hl	Riferiti ad applicazioni con sistemi di distribuzione a "volume normale" previsto almeno 15 hl/Ha per Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Olivo, Agrumi
		350 ml/hl	
AGRUMI	Tignola, Minatrice, Mosca, Cimicetta, Metcalfa, Neanidi di Cocciniglie	250-300 ml/hl	8-10 hl/Ha per Patata
		300 ml/hl	
OLIVO	Mosca, Tignola, Margaronia, Oziorrinco, Neanidi di Cocciniglie	250-300 ml/hl	
		300 ml/hl	
PATATA	Nottue, Cavolaia, Dorifora, Tignola	2,5-3,0 l/Ha	