



ZELIG 480 EC

INSETTICIDA ORGANOFOSFORICO POLIVALENTE
INDICATO PER LA DIFESA DI NUMEROSE COLTURE



COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Tignola e Tripidi Cicaline (compreso Scaphoideus) e Cocciniglie	85 - 110 mL/hL 110 mL/hL	-	30 giorni
Agrumi	Cocciniglie, Dialeurodidi e Aleurodidi Formiche	110 mL/hL 220 mL/hL	Su cocciniglie intervenire nella fase di migrazione delle neanidi Irrorare la parte basale del tronco e il terreno nella zona circostante	60 giorni
Melo e pero	Carpocapsa, Cocciniglie, Psilla, Tortricidi e Sesia	85-110 mL/hL	Su cocciniglie intervenire nella fase di migrazione delle neanidi	30 giorni
Pesco	Tignola orientale (Cidia), Anarsia, Mosca della frutta, Cocciniglie	85-110 mL/hL	Su cocciniglie intervenire nella fase di migrazione delle neanidi	30 giorni
Barbabetola da zucchero	Altica, Nottue, Atomaria	0,85-1,1 L/Ha	Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro	60 giorni
Mais	Piralide e Sesamia	1 - 1,2 L/Ha 1,2-1,7 L/Ha	Sulla 1° generazione, quando il mais ha raggiunto uno sviluppo di 60-100 cm Sulla 2° generazione, a fine luglio-agosto	30 giorni
Girasole	Nottue	0,85-1,1 L/Ha	Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro	120 giorni
Soia	Cimici, Lepidotteri fogliari Nottue	1,2 L/Ha 0,85-1,1 L/Ha	Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro Ripetere il trattamento se necessario	120 giorni
Fagiolo e pisello	Piralide ed altri Lepidotteri, Nottue	0,85-1,1 L/Ha	Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro	15 giorni
Cavoli (cavoli ad infiorescenza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo rapa)	Nottue	0,85-1,1 L/Ha	Trattamento al terreno destinato alla cultura Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro	-
Carota	Depressaria e Rapaiola, Nottue	0,85-1,25 L/Ha	Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro	21 giorni
Cipolla	Tripidi	0,85-1,1 L/Ha	-	21 giorni
Asparago, peperone, melanzana	Nottue	0,85-1,1 L/Ha	Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro	15 giorni (21 giorni peperone)
Patata	Dorifora Nottue	1,2-1,6 L/Ha 0,85-1,1 L/Ha	Ripetere se necessario Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro	30 giorni
Pomodoro	Dorifora, Piralide ed altri Lepidotteri, Nottue	0,85-1,1 L/Ha	Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro	21 giorni
Tabacco	Nottue, Tripidi e Pulce	0,85-1,1 L/Ha	Impiegare 600-800 litri di acqua per ettaro	60 giorni
Pioppo	Criptorinco, Saperda, Crisomela, Ifantria ed altri Lepidotteri defogliatori	220 mL/hL	-	-
Floreali e ornamentali (in pieno campo ed in serra)	Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi	100 mL/hL	Impiegare 800-1000 litri di acqua per ettaro	-
Esche	Nottue	50 kg/Ha di esca pronta	Preparare l'esca con crusca e melasso al 2,5% di ZELIG 480 EC (25 mL per kg di esca)	-

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



Tanica da 5 L (4x5)



Tanica da 20 L (Imballo singolo)



Insetticidi

COMPOSIZIONE

Clorpirifos puro 45% (480 g/L)

FORMULAZIONE

Liquido emulsionabile

INDICAZIONI DI PERICOLO



Xn - Nocivo



N - Pericoloso per l'ambiente

N. REGISTRAZIONE

Reg. n. 13843 del 15-04-2008