



Mondak[®] 480 S

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI A FOGLIA LARGA

MONDAK 480 S è un erbicida che possiede un ampio spettro d'azione contro le dicotiledoni annuali, triazino-resistenti, perenni e ruderali. MONDAK 480 S integra e completa l'azione dei prodotti graminicidi. MONDAK 480 S, assorbito per via fogliare e radicale, viene traslocato a livello meristemato, ove esplica la sua attività.

ERBICIDA



Mais-Sorgo



Cereali



Orticole



Erbacee

COMPOSIZIONE

Dicamba 40,3%
(480 g/l)

FORMULAZIONE

soluzione acquosa

INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)

ATTENZIONE

NUMERO DI REGISTRAZIONE

13154 del 28.8.06



DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

INFESTANTI	COLTURE	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Sensibili <i>Abutilon theophrasti</i> <i>Amaranthus</i> spp. <i>Bidens</i> spp. <i>Calystegia sepium</i> <i>Centaurea cyanus</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Cirsium arvense</i> <i>Convolvulus arvensis</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Fallopia convolvulus</i> <i>Fumaria officinalis</i> <i>Galium aparine</i> <i>Phytolacca decandra</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Polygonum persicaria</i> <i>Rumex</i> spp. <i>Senecio vulgaris</i> <i>Sicyos angulata</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Spergula arvensis</i> <i>Stellaria media</i> <i>Taraxacum officinalis</i> <i>Vicia</i> spp., <i>Xanthium</i> spp.	Mais	0,4 - 0,6	A partire dalle prime 2 foglie vere del mais e fino ad un'altezza di 40 cm, quando la maggior parte delle infestanti è già emersa e si trova nei primi stadi di sviluppo. Non impiegare la dose piena di Mondak 480 S dopo la 5ª foglia vera del mais.	20 gg
	Grano tenero Grano duro Orzo, Segale Avena	0,2 - 0,25	Dallo stadio di 4-5 foglie della coltura fino all'inizio della levata.	
	Asparago	0,1 - 0,25	In primavera, prima dell'emergenza dei turioni, su terreno umido.	
	Sorgo da granella	0,35 - 0,4	Post-emergenza, con sorgo entro le 5 foglie.	130 gg
Mediamente sensibili <i>Anagallis arvensis</i> <i>Capsella bursa-pastoris</i> <i>Chrysanthemum segetum</i> <i>Ecballium elaterium</i> <i>Matricaria chamomilla</i> <i>Papaver</i> spp. <i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Sinapis arvensis</i> <i>Urtica urens</i> , <i>Veronica</i> spp.	Prati di graminacee (da foraggio e tappeti erbosi)	0,5 <i>per applicazioni a pieno campo</i> 0,1% <i>(10 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua) per trattamenti localizzati</i>	Infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo. NOTE: Lasciare trascorrere almeno 4 giorni dal trattamento prima del taglio successivo. In caso di interventi su prati di nuovo impianto, trattare dopo il secondo taglio.	—

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Usare volumi di acqua di 200-400 l/ha con ugelli a ventaglio e bassa pressione di esercizio.

Evitare che la nube irrorante giunga a contatto di colture vicine (soia, bietola, girasole).

CONFEZIONI



flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi

