

## CALCYPIT

### Calcio liquido con Boro

- Previene le fisiopatie legate alla carenze di calcio
- Prodotto liquido di elevata purezza
- Ideale per trattamenti fogliari e fertirrigazione

CALCYPIT è un concime liquido con elevato contenuto in calcio, specifico per la prevenzione delle fisiopatie legate alla carenza di calcio (butteratura amara, marciume apicale, spaccature, ecc).

Può essere utilizzato sia per trattamenti fogliari che in fertirrigazione.

### Composizione

Ossido di calcio(CaO)	Boro(B)
15%	0,3%

### Dosi e modalità di impiego

COLTURA	Volume d'acqua utilizzata (l/ha)	Dose di prodotto	Concentrazione massima	NOTE
MELO e PERO	400-600	3-4 l/ha	0,7%	Da immediata post fioritura alla raccolta trattamenti ogni 8-10 giorni
	>600	4-5 l/ha		
DRUPACEE	400-600	2-3 l/ha	0,5%	Da scamicatura fino a 15 giorni dalla raccolta trattamenti ogni 10-15 giorni
	>600	3-4 l/ha		
ACTINIDIA	400-600	3-4 l/ha	0,7%	In immediata post fioritura 2-3 trattamenti ogni 8-10 giorni
	>600	4-5 l/ha		
POMODORO e PEPERONE	-	2-3 l/ha	0,5%	Per prevenire il marciume apicale, iniziare i trattamenti in post fioritura e nelle fasi più sensibili
VITE	400-600	2-3 l/ha	0,5%	In post fioritura ogni 10-15 giorni fino a prechiusura grappolo. Dopo la vendemmia meccanica insieme ai trattamenti fungicidi
	>600	3-4 l/ha		

MELONE	-	2-3 kg/ha	0,5%	2-3 trattamenti da ingrossamento frutto
FRAGOLA	-	2-3 kg/ha	0,5%	2-3 trattamenti da fine fioritura fino a una settimana dalla raccolta per aumentare la consistenza dei frutti
INSALATE	-	2-3 kg/ha	0,5%	Trattamenti preventivi in previsione di condizioni favorevoli allo sviluppo del Tip Burn
ZUCCHINO	-	2-3 Kg/Ha	0,5%	3 trattamenti da frutto allegato
PEPERONE	-	2-3 Kg/Ha	0,5%	3 trattamenti da frutto allegato
CETRIOLO	-	2-3 Kg/Ha	0,5%	3 trattamenti da frutto allegato
COLTURE ORTICOLE	-	2-3 Kg/Ha	0,5%	Ogni 10-15 giorni a seconda delle necessità

CALCYPIT può essere impiegato anche in fertirrigazione alla dose indicativa di 10-30 kg/ha alla concentrazione massima del 1-2‰.

La scelta dei dosaggi è sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, ecc.), per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari. Non miscelare con rame, olii, polisolfuri, dodine, prodotti fortemente alcalini e prodotti contenenti fosforo e zolfo.

E' sempre buona pratica effettuare saggi preliminari di miscibilità fisica e test su poche piante prima di estendere il trattamenti su tutta la superficie.

Effettuare i trattamenti fogliari nelle ore più fresche della giornata.



TANICA



12 Kg

30 Kg

FUSTO



250 Kg

CISTERNETTA



1250 Kg

