



Avvertenza: **PERICOLO**  
 Indicazioni di pericolo:  
**H302 - H318 - H411 - EUH401**

**FORMULAZIONE:**  
 Granuli idrosolubili

**COMPOSIZIONE:**  
 Metamitron 15% (150 g/kg)  
 contiene Calcio diformiato

**N. REGISTRAZIONE:**  
 16084 del 16-05-2014

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Melo	1,1 - 2,2 kg/ha	Applicare BREVIS® quando la dimensione media del frutto centrale misura almeno 8 - 10 mm. Qualora necessario, per aumentare l'effetto diradante, ripetere il trattamento a dimensione del frutto centrale di 12-14 mm e non oltre i 16 mm. La seconda applicazione può essere effettuata non prima di 5-10 giorni dopo la prima. Valutare una seconda applicazione localizzata solo su varietà dal dirado difficoltoso e in condizioni collinari e montane. Impianti con forte allegagione possono necessitare di un secondo trattamento, come anche impianti noti per la difficoltà di dirado. Si sconsiglia l'impiego di BREVIS® su varietà Jeromine	60 giorni
Pero	1,1 kg/ha	Applicare BREVIS® quando la dimensione media del frutto centrale è compreso tra 8 - 12 mm. Si consiglia di limitare i trattamenti alla varietà Conference. Non effettuare una seconda applicazione	
Vite da tavola	3,5 kg/ha	Applicare BREVIS® tra la fase di allegazione (BBCH 71), quando la maggior parte degli acini si è sviluppata e si verifica la completa caduta dei residui fogliari, e la fase in cui gli acini hanno raggiunto la dimensione di un grano di pepe (BBCH 73). Qualora si verifichi una fioritura non omogenea nel grappolo o non contemporanea nell'apezzamento a causa di fattori ambientali, l'effetto potrebbe essere ridotto. Utilizzare su varietà Italia e Vittoria. Si sconsiglia l'uso di BREVIS® su varietà apirene o semi-apirene. Massimo 1 trattamento/anno	

#### MISURE DI MITIGAZIONE

Per proteggere le piante non bersaglio: fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale.

Per maggiori informazioni consultare la brochure tecnica dedicata al prodotto e il sito web (<http://www.adama.com/italia/it/microsite/brevis/>)