

FUNGICIDI

Zoxium®

240 SC

Fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della vite, della patata e del pomodoro



Composizione

Zoxamide (240 g/l) 21,8%

Formulazione Sospensione concentrata

Confezioni 1 - 5 L

Registrazione n° 14062 del 10.05.2012

Tempo di carenza: Vite 28 gg.; Patata 7 gg.; Pomodoro 3 gg.

Caratteristiche

Fungicida antiperonosporico a base di Zoxamide, per la difesa della vite, della patata e del pomodoro. È dotato di elevata affinità con le cere cuticolari di foglie, grappoli e bacche, che garantisce una notevole resistenza al dilavamento. Grazie all'inedito meccanismo di azione antimittotico non presenta resistenza incrociata con altri antiperonosporici.

Indicazioni di rischio



Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (ml/ha)	Note
Vite da tavola, Vite da vino	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	62,5-75 (0,625-0,750 l/ha)	Intervenire preventivamente, ad intervalli di 8-10 giorni, al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Vista l'ottima efficacia nella protezione dei grappoli, se ne consiglia l'impiego a partire già dalla fase dei grappolini visibili (prefioritura). Se applicato nelle fasi più critiche per gli attacchi della Botrite sul grappolo consente, come effetto collaterale, il parziale contenimento anche di questa pericolosa malattia. Applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione.
Patata	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	62,5-75 (0,625-0,750 l/ha)	Intervenire preventivamente, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni. Applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione.
Pomodoro	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>) Alternaria (<i>Alternaria alternata</i> , <i>Stemphylium solani</i>)	62,5-75 (0,625-0,750 l/ha)	Intervenire preventivamente. Iniziare i trattamenti, sia in serra che in pieno campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni. Applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione.

Vantaggi

Estrema flessibilità d'impiego. Ideale nei programmi di gestione della resistenza. Fondamentale per le strategie di tipo preventivo. Elevata resistenza al dilavamento ed eccellente persistenza. Massima protezione del grappolo e dei frutti. Ottimo profilo residuale. Si acquista senza patentino. **Eccellente attività collaterale antibotritica.** Breve intervallo di sicurezza su pomodoro e patata.

Compatibilità

Per la preparazione di miscele con Fosetyl-Al, disperdere completamente nella botte Zoxium® 240 SC e in seguito aggiungere Fosetyl-Al.

Avvertenze

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza, applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo di azione.

Non applicare questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di tre volte consecutive.

Zoxium® 240 SC: marchio registrato e prodotto originale Gowan CIS.